



Pomaria
Pépinière et verger

CATALOGUE · SAISON 2026 – 2027


Arbres et arbustes fruitiers bio

Multipliés et cultivés sur place, dans le Revermont (Ain)

Plus de 90 variétés
anciennes, rustiques
et curieuses

pomaria.fr
contact@pomaria.fr · 06 79 02 62 50
Challes · 01250 Hautecourt-Romanèche





QUI SUIS-JE ?

Une pépinière pour des vergers vivants

Pendant une quinzaine d'années, j'ai travaillé dans la solidarité internationale, sur des projets d'eau, d'hygiène et d'assainissement. J'y ai appris combien l'accès à une alimentation locale et de qualité compte pour les familles.

En rentrant, je me suis formé au métier de pépiniériste, puis j'ai multiplié les stages dans l'Ain, la Drôme et la Creuse avant de créer Pomaria en 2025.

Ma conviction est simple : les vergers familiaux, partagés ou associatifs ont un rôle immense à jouer. Chaque arbre de ce catalogue a été choisi pour y trouver sa place, avec des variétés anciennes, rustiques, parfois oubliées, et quelques curiosités venues d'ailleurs.

Le verger est désormais planté à côté de la pépinière. Venez le découvrir, sur rendez-vous.

Bio

Plants cultivés en agriculture biologique.

Local

Greffés et élevés sur place, dans l'Ain.

Rustique

Des variétés choisies pour notre climat.

Conseil

Un accompagnement du choix à la plantation.

Julien Racary

Comment lire ce catalogue

Racines nues ou en pot

La racine nue est la règle à la pépinière : le plant est arraché à l'automne et se plante de novembre à mars, hors période de gel. Il reprend vite et coûte moins cher.

Certaines espèces sensibles (asiminiers, consoude...) sont élevées en pot et se plantent sur une plus longue période.

Porte-greffe

M7 : vigueur moyenne, arbre d'environ 4 m qui entre vite en production. Idéal au jardin.

Franc : vigoureux et durable, pour un grand arbre de plein vent ou un pré-verger.

Pollinisation

Beaucoup de fruitiers ont besoin d'une autre variété fleurissant à la même période pour produire.

Autofertile

Autostérile

Triploïde

Une variété triploïde ne pollinise pas les autres : prévoyez-lui deux partenaires.

Taille du scion

Le prix des arbres greffés dépend de la hauteur du plant à l'arrachage, pour une même variété.

Chaque fiche indique les tailles et tarifs proposés pour la saison.

Commander

En ligne sur pomaria.fr, ou à la pépinière sur rendez-vous. Retrait sur place ou expédition (conditions sur le site). Paiement par carte bancaire, espèces ou carte cadeau.



99 variétés, 21 espèces, 4 familles

01 Fruitiers greffés p. 5

Pommiers	18 var. · p. 6	Asiminiers	8 var. · p. 42
Poiriers	10 var. · p. 26	Plaqueminiers	4 var. · p. 51
Pruniers	4 var. · p. 37	Pêchers	4 var. · p. 56

02 Autres fruitiers p. 61

Mûriers	7 var. · p. 62	Goumis du Japon	1 var. · p. 82
Figuers	5 var. · p. 70	Chalefs d'automne	2 var. · p. 84
Grenadiers	5 var. · p. 76		

03 Petits fruits p. 87

Groseilliers à grappes	8 var. · p. 88	Vignes	5 var. · p. 111
Groseilliers à maquereau	5 var. · p. 97	Ronce fruitière (sans épine)	1 var. · p. 117
Cassissiers	4 var. · p. 103	Gojis	3 var. · p. 119
Casseilliers	2 var. · p. 108		

04 Plantes compagnes p. 123

Consoude, osier, arbre à salade	3 plantes · p. 124
------------------------------------	-----------------------

Index des variétés (A → Z)

p. 128

Pagination indicative : environ 127 pages au total.

01

Fruitiers greffés

Pommiers	18
Poiriers	10
Pruniers	4
Asiminiers	8
Plaqueminiers	4
Pêchers	4

Pommiers, poiriers, pruniers et pêchers, mais aussi asiminiers et kakis : les arbres de fond du verger, greffés sur des porte-greffes adaptés à chaque usage.

FRUITIERS GREFFÉS

Pommiers

Malus domestica · 18 variétés

Le pommier reste l'arbre roi des vergers familiaux. Notre sélection fait la part belle aux variétés anciennes et régionales, choisies pour leur rusticité, leur bonne tenue face aux maladies et, souvent, leur floraison tardive : un vrai atout dans le Revermont, où les gelées de printemps ne sont pas rares.

Toutes nos variétés sont greffées sur deux porte-greffes. Le M7, de vigueur moyenne, donne un arbre

d'environ 4 m qui entre vite en production. Le franc, vigoureux, forme un grand arbre de plein vent, durable et peu exigeant.

La plupart des pommiers sont autostériles : plantez au moins deux variétés fleurissant à la même période. Les variétés triploïdes demandent deux pollinisateurs.

Tarifs scion 0,8 – 1,2 m **15 €** · 1,2 – 2 m **20 €** · plus de 2 m **25 €**

M7 ou franc

Par ordre de maturité	Floraison	Sept	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Pollinisation	Page
Reine des reinettes 🔗	Avril (moyenne)										Part. autofertile	21
Jonagold 🔗 ÉPUISÉ	Avril (moyenne)										Triploïde	16
Chantecler 🔗	Avril (mi-tardive)										Part. autofertile	10
Jubilé 🔗	Fin avril (moyenne)										Autostérile	17
Melrose 🔗	Fin avril – déb. mai (moyenne)										Part. autofertile	18
Reinette Clochard 🔗 ÉPUISÉ	Mai (tardive)										Autostérile	22
Charden 🔗	1re quinz. mai (moyenne)										Autostérile	11
Reinette du Canada 🔗	Avril (moyenne)										Triploïde	25
Cloche 🔗	Mai (mi-tardive)										Autostérile	12
De l'Estre 🔗	Mai (mi-tardive)										Autostérile	13
Joli bois 🔗	Mai (mi-tardive)										Autostérile	15
Patte de loup 🔗	Fin avril (mi-tardive)										Autostérile	20
Reinette Desplanches 🔗	Fin avril (mi-tardive)										Autostérile	24
Belle fille de Salins 🔗	Mai (tardive)										Autostérile	9
Double Rose 🔗	Mai (mi-tardive)										Autostérile	14
Nationale 🔗	Mai (très tardive)										Autostérile	19
Reinette d'Amboulne 🔗	Fin avril (mi-tardive)										Autostérile	23
Api étoilé 🔗	Avril (précoce)										Autostérile	8

récolte

consommation

ÉPUISÉ au 24/09/2026

[🔗](#) fiche sur pomaria.fr

Le tableau classe les variétés par date de récolte ; les fiches qui suivent sont rangées par ordre alphabétique.

Bien choisir ses pommiers



Bien associer ses pommiers

Choisissez des variétés dont les floraisons se chevauchent : la colonne « Floraison » du tableau vous aide à former des couples.

Les variétés à floraison tardive (Belle fille de Salins, Nationale...) sont les plus sûres en zone gélive. Une variété triploïde (Jonagold, Reinette du Canada) ne pollinise pas les autres : prévoyez-lui deux partenaires.

Lire le tableau

Les variétés y sont classées par date de récolte. La barre orange situe la cueillette, la barre verte la période où les fruits se dégustent après conservation.

Les fiches qui suivent sont rangées par ordre alphabétique : la colonne « Page » renvoie à chacune.

M7 ou franc ?

M7 : arbre d'environ 4 m, mise à fruit rapide, idéal au jardin.

Franc : grand arbre de plein vent, vigoureux et durable, pour un pré-verger.

Conserver ses pommes

Dans un local frais, sombre, aéré et hors gel, fruits posés sans se toucher sur des clayettes. Ne gardez que les pommes saines, cueillies à la main, et surveillez-les régulièrement.

Api étoilé

Malus domestica

Pomme aplatie de forme étoilée à 5 lobes, de couleur jaune et rose présentant une chair blanche. Sa chair est ferme et rafraichissante, avec un goût équilibré. Elle se récolte à la fin du mois de novembre pour une conservation de janvier à mai.

L'arbre

Variété très ancienne originaire d'Allemagne. Il s'agit un arbre vigoureux mais de faible développement, produisant de nombreux rameaux fins et longs. Très fertile, il est particulièrement adapté aux formes basses, mais peu recommandé pour la haute-tige.

Le fruit

Petite pomme pentagonale, souvent aplatie, à peau fine jaune-vert nuancée de rouge brique sur la face exposée au soleil. Sa chair blanc verdâtre est croquante et serrée, offrant une texture ferme. Son goût est juteux, légèrement acidulé et sucré. Idéale pour une consommation fraîche et une conservation longue durée.

Culture

La plantation s'effectue entre octobre et fin mars pour ce scion en racines nues, dans un sol riche, à la structure légère et bien drainée.

TARIFS · SCION RACINES NUES

		M7	Franc
0,8 – 1,2 m	15 €	☒	☐
1,2 – 2 m	20 €	☒	☐
Plus de 2 m	25 €	☐	☐

☒ disponible · ☐ épuisé · au 24/09/2026

Floraison	Avril (précoce)
Récolte	Fin novembre
Période de consommation	Décembre à mai
Exposition	Soleil
Rusticité	-25°C
Feuillage	Caduc
Strate	Arbre
Pollinisation	Autostérile, pollinisée par Reine des reinettes, Melrose ou encore Chantecler, etc.
Caractéristiques	L'originale, pas de chute de fruits

Belle fille de Salins



Malus domestica

Variété résistante et rustique, idéale pour les régions aux printemps froids grâce à sa floraison très tardive (mi-mai) et sa grande résistance au gel. C'est un arbre productif, qui offre une récolte en octobre-novembre, et une bonne conservation des fruits pouvant aller jusqu'à 7 mois.

L'arbre

Variété ancienne originaire du Jura, elle se distingue par sa floraison tardive intervenant à la fin du mois de mai.

Avec une rusticité allant jusqu'à -30°C et grâce à sa floraison tardive, elle peut être adaptée aux zones de moyenne montagne.

Le fruit

Pomme de calibre moyen, à peau jaune striée de rouge. Sa chair blanche est croquante, ferme et bien juteuse. Elle dévoile un goût sucré, peu acide et très parfumé. Idéale pour une consommation crue ou en compote.

Culture

La plantation s'effectue entre octobre et fin mars pour ce scion en racines nues, dans un sol riche, à la structure légère et bien drainée.

TARIFS · SCION RACINES NUES

		M7	Franc
0,8 – 1,2 m	15 €	●	○
1,2 – 2 m	20 €	●	○
Plus de 2 m	25 €	●	○

● disponible · ○ épuisé · au 24/09/2026

Floraison	Mai (tardive)
Récolte	Fin octobre
Période de consommation	Novembre à avril
Exposition	Soleil
Rusticité	-30°C
Feuillage	Caduc
Strate	Arbre
Pollinisation	Autostérile, pollinisée par Reine des reinettes et Belle de Boskoop
Caractéristiques	Floraison tardive

Chantecler

Malus domestica

Variété ancienne connue pour ses pommes jaune dorées, sucrées, acidulées et très parfumées. La chair est juteuse et croquante à la récolte puis devient fondante. Maturité à partir de début octobre.

L'arbre

Obtention de l'INRA issue du croisement de la Golden Delicious avec la Reinette Clochard. Elle fut inscrite au catalogue en 1977 comme l'une des meilleures variétés du moment. La floraison a lieu en avril, de manière assez tardive ce qui limite son exposition aux gelées tardives. C'est un arbre vigoureux, de mise à fruit rapide et très productif.

Le fruit

Pomme légèrement aplati et côtelé à la peau de couleur jaune dorée. Sa chair croquante et juteuse à la récolte se prête bien à la consommation directe. Elle devient fondante plus tard en saison, elle est alors parfaite pour les préparations culinaires. Excellente qualité gustative, très sucrée, acidulée et bien parfumée.

Culture

La plantation s'effectue entre octobre et fin mars pour ce scion en racines nues, dans un sol riche, à la structure légère et bien drainée. Cette variété est assez sensible aux maladies et particulièrement à la tavelure.

TARIFS · SCION RACINES NUES

		M7	Franc
0,8 – 1,2 m	15 €	☐	☐
1,2 – 2 m	20 €	☒	☐
Plus de 2 m	25 €	☒	☐

☒ disponible · ☐ épuisé · au 24/09/2026

Floraison	Avril (mi-tardive)
Récolte	Fin septembre
Période de consommation	Octobre à février
Exposition	Soleil
Rusticité	-25°C
Feuillage	Caduc
Strate	Arbre
Pollinisation	Partiellement autofertile, pollinisée par R. des reinettes et Melrose ou R. Clochard, etc.
Caractéristiques	Fruits très aromatiques, fondants

Charden

Malus domestica

Très bonne pomme issue du croisement de Golden Delicious et de Reinette Clochard. Chair blanc-crème, juteuse, croquante, sucrée et acidulée, bien parfumée. Variété tardive de très bonne conservation.

L'arbre

Obtention de l'Inra d'Angers issue du croisement entre 'Golden Delicious' et 'Reinette Clochard' (inscrite au CTPS en 1971) qui se caractérise par sa production généreuse et assez régulière, étant peu sensible à l'alternance. Il s'agit d'une variété très vigoureuse et à mise à fruit rapide.

Le fruit

Pomme de gros calibre et de bel aspect, à l'épiderme couleur blanc-jaunâtre assez ressemblant à Golden. Sa chair est douce, ferme et croquante, de couleur blanc-crème. Le goût est sucré, parfumé et acidulé. Le fruit est aussi bon cru que cuit. La Charden peut se conserver jusqu'en avril dans de bonnes conditions de stockage.

Culture

La plantation s'effectue entre octobre et fin mars pour ce scion en racines nues, dans un sol riche, à la structure légère et bien drainée.

TARIFS · SCION RACINES NUES

		M7	Franc
0,8 – 1,2 m	15 €	☒	☐
1,2 – 2 m	20 €	☒	☐
Plus de 2 m	25 €	☒	☐

☒ disponible · ☐ épuisé · au 24/09/2026

Floraison	1ère quinzaine de mai (moyenne)
Récolte	Début octobre
Période de consommation	Décembre à avril
Exposition	Soleil
Rusticité	-30°C
Feuillage	Caduc
Strate	Arbre
Pollinisation	Autostérile, pollinisée par Reine des reinettes ou encore Melrose
Caractéristiques	Gros calibre, longue conservation

Cloche

Malus domestica

Variété ancienne dont les fruits ont la forme de cloches. Pomme particulièrement appréciée pour sa saveur délicate et équilibrée et de bonne conservation.

L'arbre

Variété ancienne cultivée dans l'est de la France et en Suisse. Elle offre de superbes fruits à la forme de cloches. Elle est peu sensible aux gelées printanières. Pommier de vigueur moyenne, avec une mise à fruit rapide.

Le fruit

Gros fruit, avec un épiderme jaune-verdâtre, teinté de rouge du côté exposé au soleil. Sa chair est blanche, ferme, croquante, peu juteuse. Elle dévoile un goût sucré, peu acide et très parfumé, avec une acidité rafraîchissante rappelant la rhubarbe et le citron. Le poids moyen des fruits est d'environ 140 à 185 g.

Elle est également très appréciée en cuisine, lorsqu'après stockage elle a atteint sa pleine maturité gustative. Elle peut ainsi être utilisée jusqu'au printemps.

Culture

La plantation s'effectue entre octobre et fin mars pour ce scion en racines nues, dans un sol riche, à la structure légère et bien drainée. C'est une excellente variété de pomme de conservation. Elles se gardent tout l'hiver, en restant très juteuses.

TARIFS · SCION RACINES NUES

		M7	Franc
0,8 – 1,2 m	15 €	●	○
1,2 – 2 m	20 €	●	○
Plus de 2 m	25 €	●	○

● disponible · ○ épuisé · au 24/09/2026

Floraison	Mai (mi-tardive)
Récolte	Mi-octobre
Période de consommation	Décembre à avril
Exposition	Soleil
Rusticité	-25°C
Feuillage	Caduc
Strate	Arbre
Pollinisation	Autostérile, pollinisée par Reine des reinettes et Reinette Clochard, Reinette d'Amboulne
Caractéristiques	Gros calibre, mise à fruit rapide



De l'Estre

Malus domestica

Très bonne pomme à la chair ferme, sucrée, un peu acide et juteuse et bien parfumée. Elle se consomme à partir de décembre, avec une bonne conservation. Variété rustique et peu sensible aux maladies, excellente pour les jardiniers amateurs.

L'arbre

Variété ancienne (1750) originaire du Limousin et d'Auvergne (aussi appelée Reinette de Brive, Sainte-Germaine,...). Variété de port érigé à faible vigueur. Sa floraison mi-tardive lui permet d'éviter les gelées printanières. Mise à fruit lente.

Le fruit

Fruit de forme conique, fortement pentagone. Excellente qualité gustative, avec une chair type reinette, très sucrée, acidulée, juteuse et très parfumée. Pomme délicieuse aussi bien cru que cuite et de très longue garde.

Culture

La plantation s'effectue entre octobre et fin mars pour ce scion en racines nues, dans un sol riche, à la structure légère et bien drainée.

Cette variété présente une faible sensibilité aux parasites, à la tavelure sur feuille et fruit, au monilia et aux pucerons. A tendance à alterner, l'éclaircissage est donc recommandé. Elle est bien adaptée aux conditions d'altitude.

TARIFS · SCION RACINES NUES

		M7	Franc
0,8 – 1,2 m	15 €	☐	☐
1,2 – 2 m	20 €	☒	☐
Plus de 2 m	25 €	☒	☐

☒ disponible · ☐ épuisé · au 24/09/2026

Floraison	Mai (mi-tardive)
Récolte	Mi-octobre
Période de consommation	Décembre à mars
Exposition	Soleil
Rusticité	-25°C
Feuillage	Caduc
Strate	Arbre
Pollinisation	Autostérile, pollinisée par Reine des reinettes et Reinette Clochard, Reinette d'Amboulne
Caractéristiques	Très résistante



Double Rose [🔗](#)

Malus domestica

Pomme Double rose, originaire des Cévennes ardéchoises. Arbre élancé, de moyenne altitude. Fruit assez gros de très bonne qualité gustative. Bonne conservation.

L'arbre

Variété au port élancé originaire des Cévennes ardéchoises.

Le fruit

Fruit assez gros, de forme régulière ronde et aplatie, jaune, lavé de rose côté soleil. Chair croquante, douce très sucrée, parfumée et juteuse. Pomme à couteau de qualité supérieure, elle est aussi bonne en tarte et en compote.

Mûre dès octobre, déguster de décembre à mars ce fruit à remettre en culture.

Culture

La plantation s'effectue entre octobre et fin mars pour ce scion en racines nues, dans un sol riche, à la structure légère et bien drainée.

Variété adaptée aux conditions de moyenne altitude.

TARIFS · SCION RACINES NUES

		M7	Franc
0,8 – 1,2 m	15 €	●	○
1,2 – 2 m	20 €	●	○
Plus de 2 m	25 €	●	○

● disponible · ○ épuisé · au 24/09/2026

Floraison	Mai (mi-tardive)
Récolte	Fin octobre
Période de consommation	Mi-novembre à mars
Exposition	Soleil
Rusticité	-25°C
Feuillage	Caduc
Strate	Arbre
Pollinisation	Autostérile, pollinisée par Reine des reinettes et Reinette Clochard, Reinette d'Amboulne
Caractéristiques	Résistante, bonne conservation des fruits

Joli bois

Malus domestica

Pomme rouge à chair croquante, juteuse et sucrée. Elle se conserve très bien en cave. Variété productive et résistante à la tavelure.

L'arbre

Variété originaire de Gurgy-sur-Yonne en Bourgogne, découverte en 1907.

Le fruit

Gros fruits cylindriques jaune paille strié de rouge. La chair est blanche, bien juteuse et sucrée, avec une pointe d'acidité. Fructifie tout octobre.

Bonne qualité gustative, exprime tout son potentiel à partir de février après un séjour en cave. Pommes à couteau, à jus ou à cidre.

Culture

La plantation s'effectue entre octobre et fin mars pour ce scion en racines nues, dans un sol riche, à la structure légère et bien drainée.

Variété résistante à la tavelure et peu alternante. Elle se conserve très bien en cave et reste ferme.

TARIFS · SCION RACINES NUES

		M7	Franc
0,8 – 1,2 m	15 €	☒	☐
1,2 – 2 m	20 €	☒	☐
Plus de 2 m	25 €	☒	☐

☒ disponible · ☐ épuisé · au 24/09/2026

Floraison	Mai (mi-tardive)
Récolte	Mi-octobre
Période de consommation	Décembre à mai
Exposition	Soleil
Rusticité	-25°C
Feuillage	Caduc
Strate	Arbre
Pollinisation	Autostérile, pollinisée par R. des reinettes et Reinette Clochard, Melrose, ...
Caractéristiques	Très résistante, excellente conservation

Jonagold

Malus domestica

Croisement moderne alliant le croquant sucré de Golden Delicious et le mordant de Jonathan. Gros fruit rouge carmin pointillé d'or, récolté de mi-septembre à octobre.

— L'arbre

Jonagold est une obtention américaine issue du croisement entre Golden Delicious et Jonathan, dont elle tire son nom. Sa croissance est modérée et sa mise à fruit relativement rapide, entre trois et cinq ou six ans selon le sol et les conditions.

— Le fruit

Gros fruit à l'épiderme rouge carmin pointillé de jaune d'or, avec parfois quelques plages restées vert-jaune. La chair est croquante, juteuse, très sucrée avec une acidité présente qui en fait une pomme à couteau très agréable : c'est la synthèse de ses deux parents, le sucre et le croquant de Golden Delicious, le mordant de Jonathan. Maturité de mi-septembre à octobre. Elle se conserve bien plusieurs mois au frais, ce qui en a fait l'une des grandes variétés commerciales européennes.

— Culture

Sol profond, frais et drainé, exposition ensoleillée. Jonagold est triploïde : son pollen est stérile. Elle doit être accompagnée de préférence de deux autres variétés diploïdes à floraison compatible pour être elle-même correctement fécondée. Éclaircissage utile pour tenir le calibre des pommes.

TARIFS · SCION RACINES NUES

ÉPUISÉ

		M7	Franc
0,8 – 1,2 m	15 €	☐	☐
1,2 – 2 m	20 €	☐	☐
Plus de 2 m	25 €	☐	☐

☒ disponible · ☐ épuisé · au 24/09/2026

Floraison	Avril (moyenne)
Récolte	Mi-septembre à octobre
Période de consommation	Octobre à janvier
Exposition	Soleil
Rusticité	-25°C
Feuillage	Caduc
Strate	Arbre (développement modéré)
Pollinisation	Triploïde — deux variétés pollinisatrices nécessaires
Caractéristiques	Gros fruit sucré-acidulé, mise à fruit rapide, bonne conservation

Jubilé

Malus domestica

Très bonne pomme croquante, juteuse, très sucrée et légèrement acidulée. Variété moderne résistante aux maladies.

L'arbre

Cultivar moderne sélectionnée par la pépinière Delbard parmi 1 200 croisements. Elle a été inscrite au catalogue officiel en 1983. Arbre très productif.

Le fruit

Gros fruit de couleurs rouge et or éclatantes, à la chair croquante avec un excellent goût, très aromatique et un bon équilibre entre sucré et acide. Excellent fruit de bouche, également adaptée pour la cuisson, sorbets, ect.).

Culture

La plantation s'effectue entre octobre et fin mars pour ce scion en racines nues, dans un sol riche, à la structure légère et bien drainée.

Plus adaptée à la moitié nord de la France, ou légèrement en altitude pour assurer une belle coloration et une qualité gustative optimale.

Bonne résistance à la tavelure et à l'oïdium.

TARIFS · SCION RACINES NUES

		M7	Franc
0,8 – 1,2 m	15 €	●	○
1,2 – 2 m	20 €	●	○
Plus de 2 m	25 €	●	○

● disponible · ○ épuisé · au 24/09/2026

Floraison	Fin avril (moyenne)
Récolte	Fin septembre
Période de consommation	Fin septembre à décembre
Exposition	Soleil
Rusticité	-30°C
Feuillage	Caduc
Strate	Arbre
Pollinisation	Autostérile, pollinisée par Reine des reinettes, Chantecler, Melrose, etc.
Caractéristiques	Grosse pomme, adaptée aux zones froides

Melrose

Malus domestica

Pomme rouge de gros calibre à chair jaune très croquante avec un goût sucré acidulé. Pomme à couteau ou à cuire.

TARIFS · SCION RACINES NUES

		M7	Franc
0,8 – 1,2 m	15 €	☐	☐
1,2 – 2 m	20 €	☒	☐
Plus de 2 m	25 €	☒	☐

☒ disponible · ☐ épuisé · au 24/09/2026

— L'arbre

Variété originaire de l'Ohio (USA), issue d'un croisement entre 'Jonathan' et 'Red delicious', propagée depuis 1937. Pommier à port semi érigé, vigoureux, se ramifiant abondamment.

— Le fruit

Pomme rouge de gros calibre, à la chair jaune, très croquante et juteuse. Qualité gustative excellente : parfumée, sucrée et acidulé. C'est un fruit de table de très bonne conservation. Se prête à la cuisson, après un séjour en cave, permettant de développer ses riches arômes.

— Culture

La plantation s'effectue entre octobre et fin mars pour ce scion en racines nues, dans un sol riche, à la structure légère et bien drainée. Variété peu sensible au feu bactérien et aux maladies classiques du pommier.

Floraison	Fin avril à début mai (moyenne)
Récolte	Fin septembre
Période de consommation	Octobre à avril
Exposition	Soleil
Rusticité	-25°C
Feuillage	Caduc
Strate	Arbre
Pollinisation	Partiellement autofertile, pollinisation par Reine des reinettes, Jubilé, Chantecler, etc.
Caractéristiques	Gros calibre, facile à cultiver

Nationale

Malus domestica

Pomme tardive du Rhône à l'épiderme presque entièrement rouge sang. Chair fine, sucrée et juteuse, très rafraîchissante. Floraison très tardive, adaptée à l'altitude.

TARIFS · SCION RACINES NUES

		M7	Franc
0,8 – 1,2 m	15 €	☒	☐
1,2 – 2 m	20 €	☐	☐
Plus de 2 m	25 €	☐	☐

☒ disponible · ☐ épuisé · au 24/09/2026

— L'arbre

Variété ancienne originaire du Rhône, connue aussi sous les noms de Cusset Rouge, Déesse Nationale ou Bernardin. Comme sa parente Cusset, elle se caractérise par une floraison très tardive, atout majeur dans les secteurs sujets aux gelées de printemps : c'est ce qui permet de la planter en altitude là où des variétés à floraison précoce perdent régulièrement leur récolte. L'arbre est rustique et de maturité tardive.

— Le fruit

Fruit arrondi, un peu large, dont l'épiderme est recouvert d'un rouge sang profond sur fond jaune. La chair est blanche à verdâtre, fine, sucrée, juteuse et peu acide, au parfum discret mais agréable, et remarquablement rafraîchissante. Récolte à la fin du mois d'octobre. Elle se conserve jusqu'en mars, ce qui en fait l'une des dernières pommes de l'année à être consommées. Excellente au couteau comme en jus.

— Culture

Sol ordinaire, frais et drainé, exposition ensoleillée. Sa floraison très tardive la destine aux vergers d'altitude et aux situations gélives. Non autofertile : la présence de deux pommiers améliore nettement la fructification. Récolte fin octobre, conservation en fruitier frais et ventilé.

Floraison	Mai (très tardive)
Récolte	Fin octobre
Période de consommation	Décembre à mars
Exposition	Soleil
Rusticité	-25°C
Feuillage	Caduc
Strate	Arbre
Pollinisation	Autostérile — Reine des reinettes, Reinette du Mans
Caractéristiques	Épiderme rouge sang, floraison tardive, très rafraîchissante

Patte de loup

Malus domestica

Variété ancienne connue pour sa griffure caractéristique et ses qualités gustatives. Sa texture est croquante et son goût sucré et parfumé. Se récolte mi-octobre pour une conservation jusqu'en mars.

L'arbre

Variété très ancienne dont on trouve des traces au 18ème siècle et originaire du Maine-et-loire. C'est un pommier vigoureux et fertile, à port érigé. Il demande un peu de patience car sa mise à fruit est assez lente.

Le fruit

Fruit de taille moyenne, de couleur grise-marron ayant un toucher rugueux et un épiderme épais, parfois marqué d'une griffe. Sa chair est croquante, fine, douce, à saveur sucrée avec peu d'acidité et délicatement parfumée. Elle présente des arômes plus développés entre janvier et mars, après avoir mûré en cave. Fruit de table et à cuire.

Culture

La plantation s'effectue entre octobre et fin mars pour ce scion en racines nues, dans un sol riche, à la structure légère et bien drainée. Arbre adapté à la culture en plaine. La pomme étant bien attachée à l'arbre, on peut le cultiver dans des zones ventées. Il a une tendance à l'alternance.

Variété peu sensible aux parasites, en particulier à la tavelure.

TARIFS · SCION RACINES NUES

		M7	Franc
0,8 – 1,2 m	15 €	☒	☐
1,2 – 2 m	20 €	☒	☐
Plus de 2 m	25 €	☒	☐

☒ disponible · ☐ épuisé · au 24/09/2026

Floraison	Fin avril (mi-tardive)
Récolte	Mi-octobre
Période de consommation	Décembre à mars
Exposition	Soleil
Rusticité	-25°C
Feuillage	Caduc
Strate	Arbre
Pollinisation	Autostérile, pollinisation par Reine des reinettes, Jubilé, Chantecler, etc.
Caractéristiques	Surprenante

Reine des reinettes



Malus domestica

Très bonne pomme ancienne, à la chair croquante et juteuse, sucrée, délicieusement acidulée et parfumée. Se récolte en septembre pour une conservation jusqu'à fin décembre. Très utile pour la pollinisation des autres variétés.

L'arbre

Variété ancienne née vers 1770, originaire de Hollande. Arbre vigoureux et très productif. Il est particulièrement recommandé pour améliorer la fructification d'autres variétés de pommiers, grâce à sa floraison prolifique.

Le fruit

Fruit de calibre moyen, à l'épiderme lisse et brillant, jaune orangé strié de rouge. Sa chair blanche et juteuse offre un goût équilibré, sucré avec une pointe d'acidité et agréablement parfumé. A consommer frais ou transformé (pâtisserie, cuisson, jus, etc.).

Culture

La plantation s'effectue entre octobre et fin mars pour ce scion en racines nues, dans un sol riche, à la structure légère et bien drainée. Arbre polyvalent adapté à tout type de situation. Les pommes mûres tombent facilement indiquant le début de la récolte.

TARIFS · SCION RACINES NUES

		M7	Franc
0,8 – 1,2 m	15 €	☐	☐
1,2 – 2 m	20 €	☒	☐
Plus de 2 m	25 €	☒	☐

☒ disponible · ☐ épuisé · au 24/09/2026

Floraison	Avril (moyenne)
Récolte	Début septembre
Période de consommation	Septembre à décembre
Exposition	Soleil
Rusticité	-25°C
Feuillage	Caduc
Strate	Arbre
Pollinisation	Partiellement autofertile, pollinisation par Chantecler, Melrose, Jubilé, etc.
Caractéristiques	Acidulée et aromatique, pollinisatrice

Reinette Clochard



Malus domestica

Pomme ancienne des Deux-Sèvres, jaune d'or piquetée de points bruns à maturité. Chair ferme, juteuse et sucrée, légèrement acidulée et très parfumée. Se conserve très bien jusqu'en février, puis en cuisson.

L'arbre

Variété ancienne originaire des Deux-Sèvres. Arbre fertile, au port érigé de type Spur, ayant donc une croissance compacte (entre-nœuds courts, feuilles groupées en bouquets). Il est assez long à mettre à fruit, mais il alterne très peu (fructification tous les ans).

Le fruit

Pomme de taille moyenne, jaune tachetée de petits points bruns lorsqu'elle est mûre. Chair ferme et juteuse, sucrée. La variété est plutôt tardive, elle se conserve très bien jusqu'en février. En mars, on l'emploie en cuisson.

Culture

La plantation s'effectue entre octobre et fin mars pour ce scion en racines nues, dans un sol riche, à la structure légère et bien drainée. Sa floraison tardive permet d'éviter les gelées printanières ; la variété peut s'adapter à la culture en altitude. Elle est peu sensible à la tavelure.

TARIFS · SCION RACINES NUES

ÉPUISÉ

		M7	Franc
0,8 – 1,2 m	15 €	☐	☐
1,2 – 2 m	20 €	☐	☐
Plus de 2 m	25 €	☐	☐

● disponible · ○ épuisé · au 24/09/2026

Floraison	Mai (tardive)
Récolte	Fin septembre
Période de consommation	Octobre à mars
Exposition	Soleil
Rusticité	-25°C
Feuillage	Caduc
Strate	Arbre
Pollinisation	Autostérile, pollinisation par Chantecler, Jubilé, Melrose, etc.
Caractéristiques	Floraison tardive



Reinette d'Amboulne [↗](#)

Malus domestica

Pomme de calibre moyen à la chair ferme, sucrée et au parfum délicat. Très bonne conservation. Variété résistante aux maladies. Floraison tardive.

— L'arbre

Variété recensée au cours du 20ème siècle en Aveyron. L'arbre est moyennement vigoureux, à production régulière.

— Le fruit

Pomme de calibre moyen à l'épiderme vert devenant jaune/rosé à maturité. La chair est ferme, sucrée. Très bonne conservation. Son parfum délicat demande un peu de maturation en cave pour s'épanouir pleinement (consommation de décembre à avril). Fruit de table également adapté pour la transformation.

— Culture

La plantation s'effectue entre octobre et fin mars pour ce scion en racines nues, dans un sol riche, à la structure légère et bien drainée. Grace à sa floraison tardive, il peut s'adapter à la culture en altitude. Variété résistante aux maladies.

TARIFS · SCION RACINES NUES

		M7	Franc
0,8 – 1,2 m	15 €	●	○
1,2 – 2 m	20 €	●	○
Plus de 2 m	25 €	●	○

● disponible · ○ épuisé · au 24/09/2026

Floraison	Fin avril (mi-tardive)
Récolte	Fin octobre
Période de consommation	Décembre à avril
Exposition	Soleil
Rusticité	-25°C
Feuillage	Caduc
Strate	Arbre
Pollinisation	Autostérile, pollinisation par Reine des reinettes, Jubilé, Patte de loup, etc.
Caractéristiques	Floraison tardive

Reinette Desplanches

Malus domestica

Pomme ancienne originaire de l'Ain. Chair ferme, fine, juteuse et bien parfumée, avec un bon équilibre sucre/acidité. Très bonne conservation.

L'arbre

Variété ancienne sélectionnée à Cruzilles, dans l'Ain au 19ème siècle. Arbre de vigueur moyenne à bonne, au port semi-étalé. Mise à fruit relativement rapide et bonne régularité de mise à fruit.

Le fruit

Pomme de calibre moyen à gros. L'épiderme est jaune-vert virant au jaune doré à maturité, parfois légèrement rosé côté ensoleillé. Chair ferme, fine, juteuse et bien parfumée, offrant un bon équilibre entre sucre et acidité. Variété tardive, se conservant bien jusqu'en avril-mai. Fruit de table ou utilisée en cuisine.

Culture

La plantation s'effectue entre octobre et fin mars pour ce scion en racines nues, dans un sol riche, profond et bien drainé. Sa floraison moyennement tardive lui confère une bonne adaptation à la plupart des régions. Sensibilité modérée aux maladies courantes du pommier.

TARIFS · SCION RACINES NUES

		M7	Franc
0,8 – 1,2 m	15 €	●	○
1,2 – 2 m	20 €	●	○
Plus de 2 m	25 €	●	○

● disponible · ○ épuisé · au 24/09/2026

Floraison	Fin avril (mi-tardive)
Récolte	Mi-octobre
Période de consommation	Décembre à avril
Exposition	Soleil
Rusticité	-25°C
Feuillage	Caduc
Strate	Arbre
Pollinisation	Autostérile, pollinisation par Chantecler, Jubilé, Reinette Clochard, etc.
Caractéristiques	Locale

Reinette du Canada

Malus domestica

La pomme grise de référence en France. Chair acidulée qui tient parfaitement à la cuisson, épiderme fortement roussi. Une variété du XVIII^e siècle, encore inégalée en pâtisserie.

— L'arbre

Variété ancienne d'origine incertaine : elle figure dans les listes françaises comme pomme canadienne dès 1771, sans qu'on sache d'où elle vient réellement. Elle est aujourd'hui considérée comme la pomme grise par excellence du répertoire français. L'arbre est vigoureux, comme souvent chez les variétés triploïdes. La floraison intervient environ trois jours après celle de Cox's Orange Pippin, ce qui la situe en mi-saison.

— Le fruit

Gros fruit aplati, de 83 à 87 mm de diamètre, à l'épiderme doré très largement recouvert de rugosité liégeuse — le fameux « gris ». La chair est ferme et franchement acidulée à la récolte, riche en sucres (14 à 16 %) et notablement pourvue en vitamine C, autour de 17 mg pour 100 g. Sa qualité maîtresse est de tenir à la cuisson : elle garde sa forme, ce qui en fait la pomme des tartes, des strudels et de tout ce qui demande des quartiers qui ne s'effondrent pas. Cueillie tôt et utilisée rapidement, elle est plutôt destinée à la cuisine ; après quelques mois de conservation, elle s'attendrit et se sucre, et devient alors une bonne pomme de table.

— Culture

Sol profond et frais, drainé, exposition ensoleillée. Point essentiel : la Reinette du Canada est triploïde. Son pollen est stérile — elle ne peut féconder aucune autre variété, et elle a besoin d'un pollinisateur. Récolte en octobre, conservation en fruitier frais et ventilé.

TARIFS · SCION RACINES NUES

		M7	Franc
0,8 – 1,2 m	15 €	☒	☐
1,2 – 2 m	20 €	☒	☐
Plus de 2 m	25 €	☐	☐

☒ disponible · ☐ épuisé · au 24/09/2026

Floraison	Avril (moyenne)
Récolte	Octobre
Période de consommation	Décembre à mars
Exposition	Soleil
Rusticité	-25°C
Feuillage	Caduc
Strate	Arbre (vigoureux)
Pollinisation	Triploïde — deux variétés pollinisatrices nécessaires
Caractéristiques	Pomme grise, tient à la cuisson, riche en vitamine C

FRUITIERS GREFFÉS

Poiriers

Pyrus communis · 10 variétés

Nous vous proposons une sélection de variétés de poiriers, anciennes ou modernes, choisies pour leur

rusticité, leur résistance naturelle aux maladies et la finesse gustative de leurs fruits.

Tarifs scion 0,8 – 1,2 m **15 €** · 1,2 – 2 m **20 €** · plus de 2 m **25 €**

Farold, Kirchensaller ou franc

Par ordre de maturité	Floraison	Août	Sept	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Pollinisation	Page	
Marguerite Marillat 🔗	Avril						À consommer rapidement			Autostérile	33
Williams 🔗 ÉPUISÉ	Déb. – mi-avril (précoce – moyenne)									Autostérile	36
Président Héron 🔗 ÉPUISÉ	Fin avril (mi-saison)									Autostérile	35
Abbé Fétel 🔗	Avril, étalée									Autostérile	27
Général Leclerc 🔗	Avril									Autostérile	31
Alexandrine 🔗	Déb. mai									Autostérile	28
Elliot 🔗	Mi-avril – déb. mai (mi-précoce – moyenne)									Autostérile	30
Harrow Sweet 🔗	Mi-avril									Autostérile	32
Doyenné Boussoch 🔗	Avril (mi précoce – moyenne)									Autostérile	29
Martin Sec 🔗 ÉPUISÉ	Fin avril – déb. mai (tardive)									Autostérile	34

récolte

consommation

ÉPUISÉ au 24/09/2026

[🔗](#) fiche sur pomaria.fr

Le tableau classe les variétés par date de récolte ; les fiches qui suivent sont rangées par ordre alphabétique.

Abbé Fétel

Pyrus communis

Grosse poire allongée à l'épiderme jaune d'or ponctué de brun, très sucrée. Sa floraison étalée limite les dégâts des gelées tardives.

TARIFS · SCION RACINES NUES

		Farold	Franc	Kirchensaller
0,8 – 1,2 m	15 €	●	○	○
1,2 – 2 m	20 €	●	○	○
Plus de 2 m	25 €	○	○	○

● disponible · ○ épuisé · au 24/09/2026

L'arbre

Arbre de bonne vigueur, à la floraison étalée dans le temps permettant à une partie des fleurs d'échapper aux gelées printanières tardives. La variété a été obtenue par l'abbé Fétel, curé de Chessy dans le Rhône, qui entreprit ses croisements en 1865 à partir de variétés locales et les poursuivit après sa mutation à Charentay ; le résultat porte son nom. Passée en Italie, elle y est devenue la poire la plus produite et la plus exportée du pays, cultivée principalement en Émilie-Romagne, où elle bénéficie d'une indication géographique protégée.

Le fruit

Très grosse poire, remarquablement allongée — cette silhouette est sa signature, immédiatement reconnaissable. L'épiderme est jaune d'or, couvert de nombreuses lenticelles et de plages plus brunes. C'est une poire de table très sucrée, à la chair fine et fondante. Sa conservation est excellente : en chambre froide, elle tient jusqu'à vingt-trois semaines, ce qui explique sa carrière commerciale. Au jardin, en cave fraîche, elle se garde plusieurs semaines après une récolte de septembre.

Culture

Sol profond, frais et drainé, exposition ensoleillée. La floraison étalée en fait une variété intéressante dans les secteurs exposés aux gelées tardives, sans pour autant dispenser de choisir un emplacement abrité des gels de printemps. Autostérile comme la plupart des poiriers : prévoir une variété pollinisatrice à floraison compatible. Récolte en septembre, avant maturité complète.

Floraison	Avril, étalée
Récolte	Septembre
Période de consommation	Septembre à novembre
Exposition	Soleil
Rusticité	-25°C
Feuillage	Caduc
Strate	Arbre
Pollinisation	Autostérile — prévoir un pollinisateur
Caractéristiques	Fruit allongé caractéristique, très sucrée, floraison étalée

Alexandrine

Pyrus communis

Poirier ancien à chair fine et parfumée. Fruit côtelé, jaune bronzé avec des reflets rosés. Très bonne productivité. Maturité fin septembre. Consommation en octobre.

TARIFS · SCION RACINES NUES

		Farold	Franc	Kirchensaller
0,8 – 1,2 m	15 €	☐	☐	☐
1,2 – 2 m	20 €	☒	☐	☐
Plus de 2 m	25 €	☐	☐	☐

● disponible · ○ épuisé · au 24/09/2026

— L'arbre

Variété ancienne obtenue en 1849 par Constant Douillard, architecte à Nantais. L'arbre présente une vigueur moyenne avec un port assez ouvert et très ramifié. Il est caractérisé par une mise à fruit rapide et une production forte et régulière.

— Le fruit

Le fruit est de calibre moyen, de forme allongée, irrégulière, ventrue vers la base et amincie près du sommet, avec une peau jaune bronzé et des reflets rose saumon du côté ensoleillé. La chair est blanche, assez ferme, fine, juteuse et fondante. Poire très sucrée avec un parfum agréable.

— Culture

La plantation s'effectue entre novembre et fin mars, dans un sol riche, profond et bien drainé. Poirier résistant à la tavelure.

Floraison	Début mai
Récolte	Mi-septembre
Période de consommation	Octobre
Exposition	Soleil
Rusticité	-20°C
Feuillage	Caduc
Strate	Arbre
Pollinisation	Autostérile, pollinisation par Williams, Doyenné du Comice, Conférence, etc.
Caractéristiques	Productive, résistante

Doyenné Boussoch



Pyrus communis

Poirier ancien originaire de Belgique. Gros fruits globuleux à chair fondante, juteuse et parfumée. À consommer rapidement après récolte.

L'arbre

Variété très ancienne, aussi appelée Beurré de Mérode, obtenue vers 1800 par le botaniste belge Jean-Baptiste Van Mons. Elle est originaire de la province d'Anvers, en Belgique. Arbre de vigueur moyenne. Il est très fertile mais a tendance à l'alternance et à la chute des fruits.

Le fruit

Le fruit est de gros calibre, de forme ovoïde globuleuse. L'épiderme est vert devenant jaune à maturité, parfois carminé sur la face exposée au soleil. La chair est blanche jaunâtre, bien fondante, sucrée, très juteuse et agréablement acidulée. Fruit très parfumé et de bonne qualité. A récolter dès le début de leur coloration jaune et à consommer rapidement.

Culture

La plantation s'effectue entre novembre et fin mars, dans un sol riche, profond et bien drainé. Il est moyennement sensible à la tavelure sur fruits et feuilles.

TARIFS · SCION RACINES NUES

		Farold	Franc	Kirchensaller
0,8 – 1,2 m	15 €	●	○	○
1,2 – 2 m	20 €	○	○	○
Plus de 2 m	25 €	○	○	○

● disponible · ○ épuisé · au 24/09/2026

Floraison	Avril (mi précoce à moyenne)
Récolte	Fin septembre
Période de consommation	Octobre à novembre
Exposition	Soleil
Rusticité	-20°C
Feuillage	Caduc
Strate	Arbre
Pollinisation	Autostérile, pollinisation par Williams, Doyenné du Comice, Conférence, etc.
Caractéristiques	Très productive, fruits de qualité

Elliot

Pyrus communis

Poirier d'automne à gros fruits bronze, chair croquante et très sucrée. Excellente conservation jusqu'en janvier.

TARIFS · SCION RACINES NUES

		Farold	Franc	Kirchensaller
0,8 – 1,2 m	15 €	●	○	○
1,2 – 2 m	20 €	●	○	○
Plus de 2 m	25 €	○	○	○

● disponible · ○ épuisé · au 24/09/2026

— L'arbre

Le poirier 'Elliot' est une variété originaire de Californie. Arbre de vigueur moyenne avec un port tombant. La mise à fruit est lente.

— Le fruit

Fruit de gros calibre à l'épiderme de couleur bronze, avec une face cuivrée très attractive et légèrement rugueux. La chair est croquante, juteuse, sucrée et acidulée, avec un taux de sucre élevé (16° Brix). La récolte a lieu mi-septembre, et les fruits se conservent très bien, jusqu'en janvier en condition optimale.

— Culture

La plantation s'effectue de novembre à avril, dans un sol frais, profond, riche et bien drainé. Cette variété adaptée aux régions chaudes peut affronter des étés rigoureux. Elle est peu sensible au feu bactérien.

Floraison	Mi-avril à début mai (mi-précoce à moyenne)
Récolte	Mi-septembre
Période de consommation	Octobre à janvier
Exposition	Soleil
Rusticité	-20°C
Feuillage	Caduc
Strate	Arbre
Pollinisation	Autostérile, pollinisation par Williams, Harrow Sweet, etc.
Caractéristiques	Gros calibre, excellente conservation

Général Leclerc

Pyrus communis

Poirier vigoureux et productif, aux gros fruits jaune bronze à chair fine, juteuse et parfumée. Excellente qualité gustative. Maturité en octobre, bonne conservation jusqu'en janvier.

— L'arbre

Variété obtenue en 1950 par Charles-Alfred Nomblot, pépiniériste des Hauts-de-Seine, à partir d'un semis de 'Doyenné du Comice'. Arbre vigoureux, à port érigé. Il est très productif, avec une mise à fruit rapide et une production régulière avec une légère tendance à l'alternance.

— Le fruit

Le fruit est de calibre moyen à gros. L'épiderme est épais, légèrement rugueux, passant du vert clair au jaune bronze à maturité. La chair est blanche, fine, fondante, juteuse, sucrée, agréablement acidulée et parfumée. Les fruits se récoltent dès début septembre et peuvent se conserver jusqu'en décembre

— Culture

La plantation s'effectue de novembre à avril, dans un sol frais, profond, riche et bien drainé. Il est rustique, supportant des températures jusqu'à -25°C. Peu sensible à la tavelure.

TARIFS · SCION RACINES NUES

		Farold	Franc	Kirchensaller
0,8 – 1,2 m	15 €	☐	☒	☐
1,2 – 2 m	20 €	☒	☒	☐
Plus de 2 m	25 €	☐	☐	☐

☒ disponible · ☐ épuisé · au 24/09/2026

Floraison	Avril
Récolte	Début septembre
Période de consommation	Octobre à décembre
Exposition	Soleil
Rusticité	-25°C
Feuillage	Caduc
Strate	Arbre
Pollinisation	Autostérile, pollinisation par Conférence, Doyenné du Comice, Williams, etc.
Caractéristiques	Très productif, mise à fruit rapide, bonne conservation.

Harrow Sweet [🔗](#)

Pyrus communis

Variété moderne, résistante au feu bactérien. Fruits de grande qualité gustative, à chair fondante et juteuse, se conservant bien jusqu'à novembre.

TARIFS · SCION RACINES NUES

		Farold	Franc	Kirchensaller
0,8 – 1,2 m	15 €	●	○	○
1,2 – 2 m	20 €	●	○	○
Plus de 2 m	25 €	○	○	○

● disponible · ○ épuisé · au 24/09/2026

— L'arbre

Variété moderne de poirier issue d'un croisement entre les variétés 'Old Home' et 'Purdue 5118', obtenue en Ontario (Canada) et introduite en 1981. Arbre de vigueur moyenne, au port semi-érigé à étalé. Floraison précoce mais abondante, permettant de passer les gelées. Sa mise à fruit est rapide, avec une bonne productivité et peu d'alternance.

— Le fruit

Poire de taille moyenne à assez grosse, à l'épiderme est jaune-vert devenant jaune doré à maturité, avec une belle coloration rouge-orangé sur la face ensoleillée. Chair blanc-crème, fine, fondante, très juteuse et sucrée avec une légère acidité rafraîchissante. Arôme agréable et prononcé.

— Culture

La plantation s'effectue de novembre à avril, dans un sol frais, profond, riche et bien drainé. Haute résistance au feu bactérien, maladie particulièrement préoccupante chez les poiriers. Assez bonne conservation.

Floraison	Mi-avril
Récolte	Mi-septembre
Période de consommation	Fin septembre à novembre
Exposition	Soleil
Rusticité	-20°C
Feuillage	Caduc
Strate	Arbre
Pollinisation	Autostérile, pollinisation par Conférence, Doyenné du Comice, Williams, etc.
Caractéristiques	Productive, résistante.

Marguerite Marillat



Pyrus communis

Poire de très gros calibre, pouvant atteindre 700 g, à la chair blanche fine et fondante, juteuse et parfumée. Variété ancienne sur un arbre peu vigoureux, facile à conduire.

L'arbre

Arbre peu vigoureux, très ramifié, peut s'adapter aux petits jardins et aux formes palissées (suivant le porte-greffe). Entrée en production assez rapide. Le bois est d'un jaune très prononcé. C'est une variété ancienne française, appréciée pour la qualité de son fruit. Elle présente une bonne tolérance à la tavelure sur le fruit.

Le fruit

Fruits très gros, pouvant atteindre 700 g sur un arbre bien conduit. L'épiderme est jaune, souvent lavé de rouge sur la face exposée. La chair blanche est d'excellente qualité — fine, fondante, juteuse, parfumée, sucrée avec une légère pointe acidulée. C'est une poire de table, à consommer rapidement après cueillette : comme beaucoup de variétés d'été à gros fruits, elle ne se conserve pas et blettit vite si on la laisse mûrir sur l'arbre. La cueillette se fait donc légèrement avant maturité complète.

Culture

Sol profond, frais, drainé, plutôt fertile ; le poirier redoute autant l'excès de calcaire que la sécheresse prolongée. Exposition ensoleillée. Sa faible vigueur en fait un bon candidat pour les formes palissées — cordon, palmette — et pour les jardins de dimensions modestes. Comme la quasi-totalité des poiriers, la variété est autostérile : prévoir un pollinisateur à floraison concomitante à proximité.

TARIFS · SCION RACINES NUES

		Farold	Franc	Kirchensaller
0,8 – 1,2 m	15 €	●	○	○
1,2 – 2 m	20 €	○	○	○
Plus de 2 m	25 €	○	○	○

● disponible · ○ épuisé · au 24/09/2026

Floraison	Avril
Récolte	Août à septembre
Période de consommation	À consommer rapidement
Exposition	Soleil
Rusticité	-25°C
Feuillage	Caduc
Strate	Arbre (faible vigueur)
Pollinisation	Autostérile — prévoir un pollinisateur
Caractéristiques	Très gros fruits, faible vigueur, tolérante à la tavelure

Martin Sec

Pyrus communis

Variété ancienne extrêmement rustique et résistante, produisant des poires fauvées à chair ferme, excellente pour la cuisson.

L'arbre

Variété ancienne de poirier, probablement originaire de Champagne, cultivée depuis au moins le XVI^e siècle. L'arbre vigoureux à très grande fertilité. Sa mise à fruit est assez lente mais, une fois établi, l'arbre produit régulièrement et abondamment.

Le fruit

Poire de taille petite à moyenne (100-150g) à la chair blanc jaunâtre, assez ferme et peu juteuse. Sa saveur est sucrée et parfumée avec une saveur légèrement anisée. Poire de première qualité pour les compotes, conserves et raisiné. Elle développe en cuisson une saveur musquée caractéristique. Le fruit est meilleur après une période de conservation.

Culture

La plantation s'effectue de novembre à avril, dans un sol frais, profond, riche et bien drainé. Cette variété rustique s'adapte particulièrement bien aux climats rudes et aux terrains difficiles où d'autres poiriers peineraient à prospérer. Sa floraison tardive la protège relativement bien des gelées printanières. Sa résistance naturelle aux principales maladies en fait une variété facile à cultiver, même pour les débutants.

TARIFS · SCION RACINES NUES

ÉPUISÉ

		Farold	Franc	Kirchensaller
0,8 – 1,2 m	15 €	☐	☐	☐
1,2 – 2 m	20 €	☐	☐	☐
Plus de 2 m	25 €	☐	☐	☐

● disponible · ○ épuisé · au 24/09/2026

Floraison	Fin avril à début mai (tardive)
Récolte	Fin octobre à début novembre
Période de consommation	Novembre à février
Exposition	Soleil
Rusticité	-25°C
Feuillage	Caduc
Strate	Arbre
Pollinisation	Autostérile, pollinisation par Williams, Beurré Hardy, Conférence, etc.
Caractéristiques	Rustique, parfaite pour la cuisson

Président Héron

Pyrus communis

Variété française de 1870 produisant des fruits élégants de taille moyenne à la chair fine, fondante et très juteuse, avec une saveur équilibrée entre sucre et acidité, idéale pour la consommation fraîche d'octobre à novembre.

TARIFS · SCION RACINES NUES

ÉPUISÉ

		Farold	Franc	Kirchensaller
0,8 – 1,2 m	15 €	☐	☐	☐
1,2 – 2 m	20 €	☐	☐	☐
Plus de 2 m	25 €	☐	☐	☐

● disponible · ○ épuisé · au 24/09/2026

— L'arbre

Variété française de poirier originaire de Rouen et introduite vers 1870. Arbre de vigueur moyenne, au port semi-érigé avec une ramification assez dense. Sa mise à fruit est relativement rapide et sa productivité est bonne et régulière une fois l'arbre établi.

— Le fruit

Poire de calibre moyen à assez gros (180-250g), à la chair blanche, fine, fondante et très juteuse. Saveur sucrée, délicatement parfumée et rafraîchissante avec une légère acidité agréable. Cette variété d'automne offre un très bon équilibre entre sucre et acidité, ce qui en fait une excellente poire de table appréciée des connaisseurs.

— Culture

La plantation s'effectue entre octobre et fin mars, dans un sol fertile, profond et bien drainé. Elle est peu sensible à la tavelure et présente une résistance moyenne aux maladies courantes du poirier.

Floraison	Fin avril (mi-saison)
Récolte	Fin août
Période de consommation	Mi-sept. à décembre
Exposition	Soleil
Rusticité	-20°C
Feuillage	Caduc
Strate	Arbre
Pollinisation	Autostérile, pollinisation par Williams, Beurré Hardy, Conférence, etc.
Caractéristiques	Excellente, bonne conservation

Williams

Pyrus communis

Variété ancienne, produisant des fruits de calibre moyen à gros à la chair fine, fondante et très juteuse et parfumée. Une référence pour ses qualités gustatives.

L'arbre

Variété ancienne découverte vers 1770 en Angleterre. Vigueur moyenne à bonne, avec un port semi-érigé puis étalé avec l'âge. Sa mise à fruit est rapide et précoce. Sa productivité est excellente et régulière. Très bon pollinisateur.

Le fruit

Poire de taille moyenne à grosse (180-250g), à la chair blanche, très fine, fondante, extrêmement juteuse et parfumée. Saveur sucrée avec une légère acidité rafraîchissante et un arôme musqué unique. Cette variété d'été offre une qualité gustative exceptionnelle qui en a fait la référence des poires de table. Également très appréciée en pâtisserie et pour la production d'eau-de-vie. La conservation se limite à 2/3 semaines.

Culture

La plantation s'effectue de novembre à avril, dans un sol frais, profond, riche et bien drainé. Variété assez sensible aux maladies courantes du poirier.

TARIFS · SCION RACINES NUES

ÉPUISÉ

		Farold	Franc	Kirchensaller
0,8 – 1,2 m	15 €	☐	☐	☐
1,2 – 2 m	20 €	☐	☐	☐
Plus de 2 m	25 €	☐	☐	☐

● disponible · ○ épuisé · au 24/09/2026

Floraison	Début à mi-avril (précoce à moyenne)
Récolte	Mi-août
Période de consommation	Fin août à septembre
Exposition	Soleil
Rusticité	-20°C
Feuillage	Caduc
Strate	Arbre
Pollinisation	Autostérile, pollinisation par Comice, Harrow Sweet, Conférence, etc.
Caractéristiques	Délicieuse

FRUITIERS GREFFÉS

Pruniers

Prunus domestica · 4 variétés

Nous vous proposons une sélection de pruniers appréciés pour leur productivité, leur rusticité et la

qualité gustative de leurs fruits.

Tarifs scion 0,8 – 1,2 m **15 €** · 1,2 – 2 m **20 €** · plus de 2 m **25 €**

Myrobolan

Par ordre de maturité	Floraison	Août	Sept	Oct	Pollinisation	Page
Reine-Claude de Bavay 🔗 ÉPUISÉ	Fin mars – déb. avril (moyenne)				Autofertile	40
Reine-Claude Dorée 🔗	Fin mars – déb. avril (moyenne)				Autostérile	41
D'Ente 🔗	Déb. – mi-avril (moyenne)				Autofertile	38
Datil 🔗	Mars – avril				Autofertile	39

 récolte consommation**ÉPUISÉ** au 24/09/2026[🔗 fiche sur pomaria.fr](#)

Le tableau classe les variétés par date de récolte ; les fiches qui suivent sont rangées par ordre alphabétique.

D'Ente

Prunus domestica

Prune typique du Sud-Ouest, utilisée pour la production du pruneau d'Agen. Clone sélectionné pour sa régularité de production et sa bonne qualité gustative.

L'arbre

Nous vous proposons ce clone 707 de la variété traditionnelle utilisée pour la production du pruneau d'Agen, originaire du Lot-et-Garonne. Il se distingue par une meilleure régularité de production, et une bonne tolérance aux affections courantes du prunier. Arbre de vigueur moyenne, au port semi-érigé et retombant. Très bonne mise à fruit.

Le fruit

Le fruit est de calibre moyen à gros, légèrement ovale, à la peau fine bleue violacée couverte de pruine. La chair est jaune, juteuse, très sucrée et très parfumée, légèrement adhérente au noyau. Prune très agréable à consommer fraîche et également parfaite pour le séchage.

Culture

La plantation s'effectue de novembre à mars pour ce scion en racines nues. Comme les autres pruniers, elle demande un sol profond, bien drainé et une exposition ensoleillée. Variété ayant une sensibilité modérée à la moniliose.

TARIFS · SCION RACINES NUES

Myrobolan

0,8 – 1,2 m **15 €** ●

1,2 – 2 m **20 €** ●

Plus de 2 m **25 €** ○

● disponible · ○ épuisé · au 24/09/2026

Floraison	Début à mi-avril (moyenne)
Maturité	À partir de mi-août (2 semaines de récolte)
Exposition	Soleil
Rusticité	-20°C
Feuillage	Caduc
Strate	Arbre
Pollinisation	Autofertile ; une seconde variété (Reine-Claude d'Oullins, Quetsche d'Alsace, etc.) améliore la production
Caractéristiques	Production régulière, adaptée au séchage.

Datil

Prunus domestica

Prunes de petit calibre à la peau violet foncé et chair jaune dorée, douce et parfumée. Grande qualité gustative et très bonne résistance aux maladies.

L'arbre

Variété ancienne originaire du sud-ouest, découverte dans le Lot par le conservatoire d'Aquitaine. Elle est vigoureuse, au port érigé, de développement moyen. Elle offre une récolte abondante de fin août à début septembre.

Le fruit

Prunes de petit calibre (un peu plus gros que la mirabelle) à la peau violet très foncé. Sa chair jaune dorée, juteuse, dense et non-fibreuse, offre une saveur douce et parfumée avec une pointe d'acidité rafraîchissante. Le noyau se détache facilement de la chair. Variété productive d'excellente qualité, tant en frais que transformée en confiture, pâtisseries ou pruneaux.

Culture

Le prunier s'épanouit dans tous types de sols bien drainés, en exposition ensoleillée. Variété très résistante, peu sensible au monilia. La plantation s'effectue idéalement d'octobre à mars.

TARIFS · SCION RACINES NUES

Myrobolan

0,8 – 1,2 m **15 €** ●

1,2 – 2 m **20 €** ●

Plus de 2 m **25 €** ○

● disponible · ○ épuisé · au 24/09/2026

Floraison	Mars à avril
Maturité	Fin août à mi-septembre
Exposition	Soleil
Rusticité	-25°C
Feuillage	Caduc
Strate	Arbuste
Pollinisation	Autofertile
Caractéristiques	Productif, résistent

Reine-Claude de Bavay

Prunus domestica

Prune ancienne au goût sucré et parfumé, excellente pour la table comme pour la transformation. Chair ferme, juteuse et très sucrée. Récolte en août.

L'arbre

Variété ancienne d'origine belge obtenue en 1841. Arbre de développement moyen, à port érigé, puis tombant. Il entre rapidement en production.

Le fruit

Les fruits sont de calibre moyen, à la peau fine de couleur vert-jaune doré. La chair est jaune, ferme, juteuse et très sucrée, avec un parfum musqué caractéristique des meilleures Reine-Claudes, non adhérente au noyau. Qualité gustative exceptionnelle.

Culture

Plantation de novembre à mars pour ce scion en racines nues, en expositions ensoleillées. Arbre de très bonne rusticité, peu sensible à la monilia, peu sensible à l'éclatement et à la chute des fruits avant récolte.

TARIFS · SCION RACINES NUES

ÉPUISÉ

0,8 – 1,2 m 15 €

1,2 – 2 m 20 €

Plus de 2 m 25 €

● disponible · ○ épuisé · au 24/09/2026

Floraison	Fin mars à début avril (moyenne)
Maturité	Dernière semaine d'août (3 semaines après Reine-Claude dorée)
Exposition	Soleil
Rusticité	-20°C
Feuillage	Caduc
Strate	Arbre
Pollinisation	Autofertile ; Reine-Claude d'Oullins, Mirabelle de Nancy ou Quetsche d'Alsace à proximité améliorent la production
Caractéristiques	Productive, excellente

Reine-Claude Dorée

Prunus domestica

Prune ancienne ferme et juteuse au délicieux goût très sucré et acidulé, excellente pour la table comme pour la transformation. Récolte début août.

L'arbre

Variété ancienne, vigoureuse, à port étalé et peu ramifié. Productivité élevée.

Le fruit

Fruits de calibre moyen, à l'épiderme fin, de couleur vert-jaune doré. La chair est jaune-verdâtre, ferme, très juteuse et très sucrée, acidulée. Très bonne ! Le noyau est libre. Sa chair ferme lui donne une bonne tenue et une bonne résistance aux manipulations. Egalement très utilisée pour la transformation (conserves, confitures).

Culture

Plantation de novembre à mars pour ce scion en racines nues, en expositions ensoleillées. Variété rustique, résistante au monilia sur pousse et sur fruit. Sensibilité à la rouille et à l'éclatement des fruits avant maturité. Peu de chute de fruit avant récolte.

TARIFS · SCION RACINES NUES

Myrobolan

0,8 – 1,2 m **15 €** ●

1,2 – 2 m **20 €** ●

Plus de 2 m **25 €** ○

● disponible · ○ épuisé · au 24/09/2026

Floraison	Fin mars à début avril (moyenne)
Maturité	Première semaine d'août (récolte pendant 2 semaines)
Exposition	Soleil
Rusticité	-20°C
Feuillage	Caduc
Strate	Arbre
Pollinisation	Autostérile, pollinisation par Reine-Claude d'Oullins, Mirabelle de Nancy, prune d'Ente, etc.
Caractéristiques	Très bonne qualité gustative, polyvalente

FRUITIERS GREFFÉS

Asiminiers

Asimina triloba · 8 variétés

L'asiminier est le seul représentant tempéré d'une famille tropicale, les Annonacées — celle des chérimoles et des corossols. Il en garde tout : de grandes feuilles pendantes qui donnent au verger un air de sous-bois exotique, des fleurs pourpre foncé en

clochettes au printemps, et surtout un fruit à la chair crémeuse dont la saveur mêle la mangue, la banane et l'ananas. Rustique jusqu'à -25 °C, il n'est pratiquement touché par aucune maladie ni aucun ravageur, et se cultive sans traitement.

Tarifs Pot 5 L **50 €**

Par ordre de maturité	Floraison	Sept	Oct	Nov	Pollinisation	Page
Maria's Joy 🔗	Printemps				Autostérile	48
Rappahannock 🔗	Fin de printemps				Autostérile	50
Benny's Favorite 🔗	Avril – mai				Autostérile	43
Jerry's Big Girl 🔗	Avril – mai				Autostérile	44
KSU-Atwood 🔗	Avril – mai, longue et précoce				Autostérile	45
KSU-Chappell 🔗	Avril – mai				Autostérile	46
Lehman's Delight 🔗	Avril – mai				Autostérile	47
Overleese 🔗	Avril – mai				Autostérile	49

 récolte consommation

ÉPUISÉ au 24/09/2026

[🔗](#) fiche sur pomaria.fr

Le tableau classe les variétés par date de récolte ; les fiches qui suivent sont rangées par ordre alphabétique.

Benny's Favorite

Asimina triloba

Croisement Davis × Prolific de Jerry Lehman, très bien noté par son obtenteur. Fruits de calibre moyen, 170 à 225 g, d'excellente qualité gustative. Maturité de mi-saison.

L'arbre

Asiminier de taille modeste, formant lentement un arbre de 4 à 6 m au port pyramidal et au feuillage largement tropical d'aspect. Feuilles caduques jusqu'à 30 cm, jaune d'or en automne. Floraison pourpre foncé au printemps, sur le bois de l'année précédente. La variété est une obtention de Jerry Lehman, issue du même croisement que Maria's Joy — Davis × Prolific. Son code, VE-21, ne signifie pas « very early » comme on le lit parfois, mais renvoie à la parcelle d'origine, la vallée est du verger de l'obteneur : c'est une variété de mi-saison.

Le fruit

Fruits de calibre moyen, 170 à 225 g, à la peau qui prend une légère teinte jaune à maturité. La qualité gustative est le point fort de cette variété : Jerry Lehman lui-même la notait très favorablement, et les retours des producteurs sont unanimement positifs. La chair est crémeuse et fondante, dans le registre tropical caractéristique de l'espèce. Récolte en milieu de saison, à la main, quand le fruit cède sous la pression du doigt. Les asimines se conservent quelques jours seulement au frais. Peau et graines à écarter.

Culture

Sol profond, frais, drainé et riche en matière organique, de pH acide à neutre. Mi-ombre les premières années, puis soleil. Racine pivotante fragile : plantation sans perturber la motte, paillage épais, arrosages réguliers les deux premiers étés. Pollinisation croisée nécessaire avec une autre variété d'asiminier plantée à moins de 10 m. Une réserve à connaître : dans certains vergers américains, cette variété montre une sensibilité aux taches noires du feuillage — surveiller les jeunes sujets en année humide.

TARIFS

Pot de 5L

50 €

Disponibilités au 24/09/2026

Floraison	Avril à mai
Maturité	Début à mi-septembre
Exposition	Mi-ombre puis soleil
Rusticité	-25°C
Feuillage	Caduc
Strate	Petit arbre (4 à 6 m)
Pollinisation	Autostérile — planter une seconde variété
Caractéristiques	Excellente qualité gustative, calibre moyen, mi-saison

Jerry's Big Girl

Asimina triloba

Des fruits jusqu'à 680 g, primés au Ohio Pawpaw Festival. Chair très crémeuse au goût de banane, et jusqu'à 2,5 kg de fruits sur un seul bouquet. Récolte de mi à fin de saison.

L'arbre

Petit arbre au port pyramidal de 4 à 6 m, à croissance lente les deux ou trois premières années, le temps que s'installe la longue racine pivotante. Grandes feuilles caduques jusqu'à 30 cm, jaune d'or à l'automne. Fleurs pourpre foncé au printemps, sur le bois de l'année précédente, pollinisées par les mouches et les coléoptères. La variété, référencée sous le code 250-39, est issue d'un croisement entre Sunflower et Sam Norris-15 réalisé par Jerry Lehman, sélectionneur de l'Indiana disparu en 2020, dont le travail a durablement enrichi la gamme des asiminiers cultivés.

Le fruit

Variété à très gros calibres : les fruits pèsent couramment 285 à 450 g, elle a remporté le concours du plus gros fruit au Ohio Pawpaw Festival avec 680 g. Un seul bouquet floral peut porter jusqu'à 2,5 kg de fruits ! La chair est très crémeuse, de texture souple, avec une nette saveur de banane — un profil doux et gourmand, très accessible. Sa peau mince et fragile se colore de jaune à maturité. Variété peu adaptée au transport. Le nombre de graines est moyen. Récolte de mi à fin de saison.

Culture

Sol profond, frais, drainé, acide à neutre. Mi-ombre les premières années puis plein soleil. Manipuler la motte avec précaution à la plantation pour préserver le pivot, pailler, et arroser régulièrement les deux premiers étés. Pollinisation croisée nécessaire : prévoir une seconde variété d'asiminier à moins de 10 m. Compte tenu du poids des fruits et de la fragilité de leur peau, prévoir un paillage épais au pied pour amortir les chutes.

TARIFS

Pot de 5L

50 €

Disponibilités au 24/09/2026

Floraison	Avril à mai
Maturité	Mi à fin septembre
Exposition	Mi-ombre puis soleil
Rusticité	-25°C
Feuillage	Caduc
Strate	Petit arbre (4 à 6 m)
Pollinisation	Autostérile — planter une seconde variété
Caractéristiques	Très gros fruits (jusqu'à 680 g), goût de banane, peau fine

KSU-Atwood

Asimina triloba

Extrêmement productive — jusqu'à 150 fruits par arbre — avec 24 °Brix (très sucrée) et une résistance aux maladies remarquable. Peau bleutée, chair dorée, saveur tropicale vive.

— L'arbre

Première variété officiellement diffusée par le programme d'amélioration de la Kentucky State University, en 2009, issue de semis reçus du Maryland. Arbre de vigueur moyenne, 4 à 6 m à maturité, au port pyramidal et au grand feuillage caduc qui jaunit vivement en automne. Deux caractères le distinguent : une précocité de mise à fruit peu commune, puisqu'il commence à fleurir dès 1,20 à 1,50 m de hauteur, et une saison de floraison longue, qui étale les chances de nouaison. Sa résistance à la maladie des taches foliaires est parmi les meilleures du genre, ce qui en fait une variété facile à conduire sans traitement.

— Le fruit

Fruits de calibre moyen — 209 g en moyenne — à la peau lisse et propre, d'un vert bleuté franchement attrayant. La chair est d'un jaune doré vif, épaisse, à la texture de crème anglaise. La saveur est vive et nettement tropicale, rafraîchissante, sans la lourdeur de certaines asimines très riches. Avec 24 °Brix, elle est très sucrée, et la proportion de graines reste modérée, à 10,3 % du poids, avec des graines petites. C'est surtout la productivité qui distingue cette variété : la Kentucky State University a relevé jusqu'à 150 fruits par arbre. Récolte fin septembre. Les fruits tiennent bien après récolte, ce qui en fait la variété de référence pour la vente.

— Culture

Sol riche, profond, frais et bien drainé, de pH acide à neutre. Mi-ombre les premières années — les jeunes sujets craignent le soleil brûlant de l'après-midi — puis pleine lumière. Ne pas perturber la motte à la plantation : la racine pivotante conditionne la reprise. Paillage et arrosages suivis les deux premières années. Prévoir une seconde variété d'asiminier à moins de 10 m pour la pollinisation croisée ; la pollinisation manuelle au pinceau améliore encore la nouaison. Sa précocité lui vaut d'entrer en production plus tôt que la moyenne de l'espèce.

TARIFS

Pot de 5L

50 €

Disponibilités au 24/09/2026

Floraison	Avril à mai, longue et précoce
Maturité	Fin septembre
Exposition	Mi-ombre puis soleil
Rusticité	-25°C
Feuillage	Caduc
Strate	Petit arbre (4 à 6 m)
Pollinisation	Autostérile — planter une seconde variété
Caractéristiques	Très productive, 24 °Brix, résistante aux maladies

KSU-Chappell

Asimina triloba

27 °Brix, moins de 5 % de graines : la plus sucrée et la plus charnue de notre catalogue. Gros fruits à chair beurrée, aux notes de miel et de caramel. Croissance exceptionnellement vigoureuse.

— L'arbre

Contrairement à la plupart des asiminiers, dont la croissance juvénile est notoirement lente, KSU-Chappell est l'un des cultivars les plus vigoureux du marché : greffé, il atteint 1,20 à 1,50 m en deux saisons seulement, et forme rapidement un arbre charpenté de 4 à 6 m. Grand feuillage caduc virant au jaune, floraison pourpre foncé en avril-mai. Issu du programme de la Kentucky State University, il serait un semis de la variété Susquehanna, dont il tient la chair épaisse et beurrée. Il présente une certaine résistance aux taches foliaires.

— Le fruit

Fruits de bon calibre, généralement 225 à 340 g, certains dépassant 450 g. La chair est épaisse, beurrée, d'une richesse peu commune. Deux chiffres résument son intérêt : 27 °Brix, ce qui en fait l'une des asimines les plus sucrées qui soient, et moins de 5 % de graines en poids — la proportion la plus faible de notre sélection, qui change tout à la dégustation. L'arôme est complexe mais net, à la fois rafraîchissant et profond, avec des notes tropicales, de miel et de caramel mêlés. La peau est épaisse et résistante, ce qui facilite la manipulation. Maturité de fin septembre à début octobre.

— Culture

Sol acide à neutre, profond, frais et drainé, à l'abri des vents forts. Mi-ombre dans le jeune âge, soleil ensuite. Comme pour toutes les variétés, la motte se manipule avec précaution à la plantation et un bon paillage (paille, foin, BRF) est indispensable ; surveiller les besoins en eau les premières années. Pollinisation croisée nécessaire : prévoir une autre variété d'asiminier à proximité immédiate. Sa vigueur en fait le meilleur choix pour qui veut raccourcir l'attente avant la première récolte. Un point à connaître : certains producteurs signalent une tendance des fruits à se fendre en fin de saison.

TARIFS

Pot de 5L

50 €

Disponibilités au 24/09/2026

Floraison	Avril à mai
Maturité	Fin septembre à début octobre
Exposition	Mi-ombre puis soleil
Rusticité	-25°C
Feuillage	Caduc
Strate	Petit arbre (4 à 6 m)
Pollinisation	Autostérile — planter une seconde variété
Caractéristiques	27 °Brix, moins de 5 % de graines, très vigoureuse

Lehman's Delight

Asimina triloba

Quatre fois primée au Ohio Pawpaw Festival, dont deux fois pour le plus gros fruit. Très gros fruits à chair souple et saveur franchement sucrée. Récolte tardive.

L'arbre

Petit arbre de 4 à 6 m, au port pyramidal et au feuillage exotique. Croissance lente les premières années, le temps de l'installation racinaire, puis développement régulier. Feuilles caduques de 25 à 30 cm virant au jaune d'or, fleurs pourpre foncé au printemps sur le vieux bois. Obtention de Jerry Lehman, référencée sous le code 275-48, issue d'un croisement entre Prolific et Sam Norris-15.

Le fruit

Un palmarès qui parle de lui-même : cette variété a remporté deux fois le concours du plus gros fruit du Ohio Pawpaw Festival, en 2011 et 2012, puis décroché deux fois la deuxième place au concours de dégustation, en 2013 et 2014, en devançant chaque année quatorze autres candidats. C'est dire qu'elle réunit ce que l'on cherche rarement ensemble : le calibre et le goût. Les fruits sont très gros, à la chair souple et à la saveur franchement sucrée, d'excellente qualité. La récolte est tardive, de mi à fin de saison, ce qui en fait une bonne variété pour prolonger la cueillette après les précoces. Consommation rapide après cueillette, ou transformation en purée congelée.

Culture

Sol meuble, profond, frais et bien drainé, pH acide à neutre ; ne supporte pas l'engorgement. Mi-ombre les premières années, puis soleil. Plantation soigneuse sans casser la motte, paillage et arrosages suivis. Pollinisation croisée indispensable avec une autre variété plantée à proximité. Sa maturité tardive la rend intéressante en association avec une variété plus précoce comme Overleese ou KSU-Atwood, pour étaler la récolte sur plusieurs semaines.

TARIFS

Pot de 5L

50 €

Disponibilités au 24/09/2026

Floraison	Avril à mai
Maturité	Fin septembre à début octobre
Exposition	Mi-ombre puis soleil
Rusticité	-25°C
Feuillage	Caduc
Strate	Petit arbre (4 à 6 m)
Pollinisation	Autostérile — planter une seconde variété
Caractéristiques	Très gros fruits, récolte tardive

Maria's Joy

Asimina triloba

Vainqueur du concours du plus gros fruit au Ohio Pawpaw Festival 2012. Gros fruits de 225 à 400 g, chair douce aux arômes de tapioca et de mangue. Production généreuse et régulière.

— L'arbre

Arbre de dimensions modestes, 4 à 6 m, au port érigé et à la couronne bien formée. Grandes feuilles vert profond jusqu'à 30 cm, formant une canopée dense en été puis virant au jaune doré. Fleurs pourpre foncé en clochettes au printemps. La variété est une obtention de Jerry Lehman, sélectionneur américain de l'Indiana, issue d'un croisement entre Davis et Prolific et longtemps connue sous son code d'origine, 166-13. C'est un arbre vigoureux, à la production généreuse et régulière, que les producteurs américains jugent bien adapté à la culture commerciale.

— Le fruit

Fruits de bon calibre, généralement 225 à 400 g, à la peau fine et lisse. Elle a remporté en 2012 le concours du plus gros fruit du Ohio Pawpaw Festival, la manifestation de référence aux États-Unis. La chair est jaune, dense, peu fibreuse, particulièrement crémeuse. La saveur est douce et gourmande, avec ces arômes de tapioca et de mangue qui font sa réputation chez les amateurs — un profil rond, sans amertume ni arrière-goût. Les fruits tiennent bien sur l'arbre.

— Culture

Sol frais et profond, bien drainé et plutôt fertile. Plein soleil, sauf en région chaude où la mi-ombre est préférable, surtout dans le jeune âge. Arrosages réguliers les années suivant la plantation ; le système racinaire est fragile, éviter les transplantations. En fin d'hiver, supprimer le bois mort et les branches tournées vers l'intérieur pour équilibrer la silhouette et favoriser la fructification. La pollinisation croisée avec une autre variété est nécessaire pour une récolte pleine.

TARIFS

Pot de 5L

50 €

Disponibilités au 24/09/2026

Floraison	Printemps
Maturité	Septembre
Exposition	Soleil à mi-ombre
Rusticité	-25°C
Feuillage	Caduc
Strate	Petit arbre (4 à 6 m)
Pollinisation	Autostérile — planter une seconde variété
Caractéristiques	Gros fruits, arômes de tapioca et mangue

Overleese

Asimina triloba

Variété historique de 1950, toujours considérée comme l'une des meilleures. Gros fruits portés en grappes, chair fondante à saveur douce, et très peu de graines. Récolte fin septembre.

L'arbre

Petit arbre au port pyramidal, atteignant 4 à 6 m, à croissance lente les premières années. Ses feuilles simples, longues de 25 à 30 cm, pendent gracieusement vers le sol et donnent à l'arbre une silhouette franchement tropicale ; elles virent au jaune d'or à l'automne. Les fleurs, solitaires ou en petits groupes, apparaissent en avril-mai sur le bois de l'année précédente : six pétales brun pourpre en forme de coupe, de 3 à 5 cm, pollinisés par les mouches et les coléoptères plutôt que par les abeilles. La variété a été repérée en 1950 par W. B. Ward sur la propriété de la famille Overleese, à Rushville dans l'Indiana. Soixante-quinze ans plus tard, elle reste tenue pour l'une des meilleures asimines, aussi bien en verger de production qu'au jardin — et elle a donné naissance à deux cultivars réputés, Shenandoah et SAA Overleese.

Le fruit

Fruits de bon calibre, 250 à 300 g en moyenne, produits en abondance et regroupés par 3 à 5 sur les rameaux. La peau reste verte à maturité complète. La chair jaune orangée est onctueuse, à la saveur douce et bien équilibrée plutôt que démonstrative — c'est une asimine facile d'accès, sans l'intensité parfois écrasante des variétés très sucrées. Elle contient peu de graines, ce qui reste l'un de ses grands atouts. Récolte fin septembre-début octobre. Les fruits se cueillent quand la chair cède sous le doigt ; ils tiennent mieux la manipulation que la plupart des asimines, qualité rare dans l'espèce. La peau et les graines ne se mangent pas.

Culture

Sol profond, frais, drainé, plutôt fertile, de pH acide à neutre ; l'asiminier ne supporte ni les sols caillouteux et secs, ni l'asphyxie. Mi-ombre les premières années, puis soleil. La racine pivotante est longue et fragile : à la plantation, ne pas casser la motte et pailler généreusement. Arrosages réguliers les deux premières années. Overleese est autostérile : il lui faut une autre variété d'asiminier à moins de 10 m, la pollinisation étant assurée par des insectes peu volants. Première récolte 3 à 5 ans après plantation pour un plant greffé.

TARIFS

Pot de 5L

50 €

Disponibilités au 24/09/2026

Floraison	Avril à mai
Maturité	Fin septembre à début octobre
Exposition	Mi-ombre puis soleil
Rusticité	-25°C
Feuillage	Caduc
Strate	Petit arbre (4 à 6 m)
Pollinisation	Autostérile — planter une seconde variété
Caractéristiques	Variété historique, gros fruits en grappes, peu de graines

Rappahannock

Asimina triloba

Sélection Peterson Pawpaws® au feuillage horizontal, qui dévoile les fruits et facilite la récolte. Peau solide, saveur douce et rafraîchissante, très peu de graines.

L'arbre

Cultivar vigoureux et à croissance rapide, atteignant 5 à 6 m de haut pour 3 m de large. Sa singularité tient au port du feuillage : là où les autres asiminiers portent des feuilles pendantes, celles de Rappahannock restent horizontales. Les fruits sont donc visibles depuis le sol, ce qui simplifie beaucoup le suivi de la maturité et la cueillette. Les feuilles, longues de 25 à 30 cm, passent du vert pâle au jaune d'or à l'automne. Fleurs solitaires ou en petits groupes à la fin du printemps. La variété a été obtenue par Neal Peterson, sélectionneur américain à l'origine de la gamme Peterson Pawpaws®.

Le fruit

Fruits bien formés et remarquablement symétriques, portés isolément ou en grappes, à la peau solide qui supporte bien la manipulation — qualité rare chez l'asimine. Ils contiennent environ 6 % de graines en poids, ce qui est peu. La chair est ferme, d'une saveur douce, sucrée et rafraîchissante, avec une agréable persistance. La peau vire au jaune à maturité, repère commode pour la récolte.

Le calibre dépend beaucoup du climat : dans les régions à climat continental, les fruits restent petits, autour de 85 à 140 g ; en climat plus doux et plus humide, ils atteignent un calibre moyen à gros. La variété se montre par ailleurs sensible aux taches foliaires, et sa charpente a tendance à former des angles de branches fermés qui cassent sous la charge — une taille de formation attentive les premières années est vivement conseillée.

Culture

Plein soleil ou mi-ombre, dans un sol frais, riche et profond ; éviter les terrains caillouteux ou séchants. Arrosage et paillage à la plantation, puis arrosages réguliers les deux premières années. Les jeunes arbres demandent une protection contre le soleil direct la première année au moins. Variété non autofertile : planter un second asiminier d'une autre variété à moins de 10 m. Former la charpente dès le jeune âge pour ouvrir les angles de branches.

TARIFS

Pot de 5L

50 €

Disponibilités au 24/09/2026

Floraison	Fin de printemps
Maturité	Septembre à octobre
Exposition	Soleil à mi-ombre
Rusticité	-25°C
Feuillage	Caduc
Strate	Petit arbre (5 à 6 m)
Pollinisation	Autostérile — planter une seconde variété
Caractéristiques	Feuillage particulier, peau solide, peu de graines

FRUITIERS GREFFÉS

Plaqueminiers

4 variétés

Nous vous proposons une sélection de plaqueminiers, retenus pour leur productivité, rusticité et la qualité gustative de leurs fruits. Originaire des montagnes

subtropicales de Chine, où il pousse encore à l'état sauvage, le kaki a gagné le Japon il y a plus de mille ans.

Tarifs scion 0,8 – 1,2 m **25 €** · 1,2 – 2 m **30 €** · plus de 2 m **35 €**

Par ordre de maturité	Floraison	Oct	Nov	Déc	Pollinisation	Page
Fuyu 🔗	Mai – juin				Autofertile	52
Sofia's Gift 🔗 ÉPUISÉ	Mai – juin				Autofertile	54
Tipo 🔗	Mai – juin				Autofertile	55
Russian Beauty 🔗	Mai – juin, tardive				Autofertile	53

récolte

consommation

ÉPUISÉ au 24/09/2026[🔗](#) fiche sur pomaria.fr

Le tableau classe les variétés par date de récolte ; les fiches qui suivent sont rangées par ordre alphabétique.



Fuyu

Diospyros kaki

Le véritable clone japonais, non astringent : une variété qui se croque ferme comme une pomme, sans aucune âpreté, à n'importe quel stade de maturité.

— L'arbre

Arbre de développement moyen, extrêmement décoratif par son port, son feuillage vernissé qui s'embrase à l'automne, et la beauté de ses fruits orange suspendus aux branches nues après la chute des feuilles. C'est aussi un arbre d'ornement.

— Le fruit

Fuyu est le kaki non astringent de référence, et le vrai clone japonais. Son intérêt tient à son cycle de maturation : le fruit est consommable dur, croquant comme une pomme, sans la moindre astringence, et il reste ferme à pleine maturité. Il n'y a donc pas à attendre le bletissement, contrairement aux kakis astringents qui ne deviennent comestibles qu'une fois la chair devenue molle. Le fruit est aplati, légèrement côtelé, orange à maturité. On peut aussi le laisser blettir sur l'arbre ou après cueillette pour un profil plus sucré. Récolte à l'automne.

— Culture

Sol ordinaire, drainé, exposition ensoleillée et abritée des vents froids. Le plaqueminier demande peu : pas de traitement, peu de taille, une bonne résistance au sec une fois enraciné. La reprise est parfois lente la première année, les jeunes sujets craignent le gel sévère — un paillage et une protection hivernale les premiers hivers sont utiles hors climat doux. Variété autofertile.

TARIFS

0,8 – 1,2 m	25 €
1,2 – 2 m	30 €
Plus de 2 m épuisé	35 €

Disponibilités au 24/09/2026

Floraison	Mai à juin
Maturité	Octobre à novembre
Exposition	Soleil
Rusticité	-15°C
Feuillage	Caduc
Strate	Arbre (4 à 6 m)
Pollinisation	Autofertile
Caractéristiques	Non astringent, le plus connu des kakis-pommes



Russian Beauty

Diospyros virginiana × *Diospyros kaki*

Hybride historique de Crimée entre kaki asiatique et plaqueminier de Virginie : la rusticité de l'un, la saveur de l'autre. Kaki astringent, à consommer blet, d'une douceur remarquable, très bon.

L'arbre

Obtenu dans les années 1950 au jardin botanique Nikitsky, en Crimée, Russian Beauty compte parmi les premiers croisements réussis entre le kaki asiatique et le plaqueminier de Virginie. On le trouve aussi sous son nom d'origine, Rossiyanka. Ce croisement emprunte au plaqueminier américain sa résistance au froid, et au kaki japonais la qualité gustative de son fruit.

L'arbre est vigoureux, au port dressé et à la croissance rapide, atteignant environ 4 m après une dizaine d'années. Sa floraison tardive est un atout sous nos climats : elle met les fleurs à l'abri des gelées de printemps. Et comme tous les plaqueminiers, il ne demande aucun traitement.

Le fruit

Fruits de calibre moyen, 50 à 60 g, ronds, à la peau orange prenant une teinte rouge orangé à pleine maturité. C'est un kaki astringent : la chair reste âpre tant que le fruit est ferme, et se consomme à bletissement complet quand il devient translucide et fondant, il est alors très sucré et se déguste alors à la cuillère. Kaki de très bonne qualité gustative. Après cueillette, on le laisse finir son mûrissement en caisse à température ambiante. Récolte de fin octobre à fin novembre. Les fruits tiennent longtemps sur les branches nues après la chute des feuilles.

Culture

Emplacement ensoleillé et abrité des vents froids, dans un sol profond, riche et bien drainé ; éviter les terres calcaires, qui peuvent provoquer la chlorose. Comptez 5 à 7 m entre deux arbres. Arrosages réguliers les deux premières années et paillage du pied des jeunes sujets. Autofertile — un seul arbre suffit à obtenir des fruits, la variété étant même parthénocarpique, c'est-à-dire capable de fructifier sans la moindre pollinisation.

TARIFS

0,8 – 1,2 m	25 €
1,2 – 2 m épuisé	30 €
Plus de 2 m épuisé	35 €

Disponibilités au 24/09/2026

Floraison	Mai à juin, tardive
Maturité	Fin octobre à fin novembre
Exposition	Soleil
Rusticité	-25°C
Feuillage	Caduc
Strate	Arbre (4 à 5 m)
Pollinisation	Autofertile
Caractéristiques	Hybride très rustique, astringent, floraison tardive



Sofia's Gift

Diospyros virginiana × *Diospyros kaki*

Hybride ukrainien récent, le plus précoce de notre gamme : récolte dès la première quinzaine d'octobre. Fruits de forme carrée, orange vif, d'une douceur remarquable et d'une rusticité peu commune.

L'arbre

Sofia's Gift est un hybride de kaki récents. Il a été obtenu en 2012 au laboratoire de multiplication végétale du parc national de Sofiyivka, en Ukraine — un jardin historique qui compte parmi les plus beaux d'Europe de l'Est. Comme Russian Beauty, il croise le kaki asiatique et le plaqueminier de Virginie, plus résistant au froid que les kakis japonais.

Il se distingue par ses récoltes précoces d'abord qui commencent dès la première quinzaine d'octobre, plusieurs semaines avant les autres hybrides rustiques — un avantage décisif sous un climat où l'automne tourne vite. Sa rusticité se situe autour -28 °C, parmi les meilleures du genre.

Le fruit

Fruits de calibre moyen à gros, reconnaissables à leur forme carrée peu commune, d'un bel orange vif à maturité. C'est un kaki astringent : la chair ne devient comestible qu'une fois le fruit complètement blet, moelleux sous le doigt ; elle est alors douce, sucrée et parfumée, dans le registre des meilleurs hybrides ukrainiens. variété de très bonne conservation : les fruits gardent leur qualité gustative jusqu'à deux mois au frais après récolte, ce qui permet d'étaler largement la consommation.

Culture

Emplacement ensoleillé et abrité des vents froids, dans un sol profond, riche et bien drainé ; éviter les terres calcaires, qui provoquent la chlorose. Comptez 5 à 7 m entre deux arbres. Arrosages réguliers les deux premières années et paillage du pied des jeunes sujets. Sa précocité et sa rusticité en font l'un des kakis le mieux adapté aux vergers d'altitude et aux régions à été court.

TARIFS

ÉPUISE

0,8 – 1,2 m **épuisé** **25 €**

1,2 – 2 m **épuisé** **30 €**

Plus de 2 m **épuisé** **35 €**

Disponibilités au 24/09/2026

Floraison	Mai à juin
Maturité	Première quinzaine d'octobre
Exposition	Soleil
Rusticité	-28°C
Feuillage	Caduc
Strate	Arbre (4 à 6 m)
Pollinisation	Autofertile
Caractéristiques	Le plus précoce, fruits carrés, très rustique



Tipo

Diospyros kaki

Le kaki italien par excellence. Gros fruits jusqu'à 200 g, production généreuse et régulière, chair sucrée et parfumée. Tipo est un kaki astringent qui se consomme donc blet.

L'arbre

Tipo est la variété de kaki la plus cultivée en Italie, où elle représente à elle seule plus de 90 % de la production de Campanie. C'est le kaki qu'on trouve sur tous les marchés italiens à l'automne. L'arbre est puissant, au port dense et compact, d'une productivité abondante et très régulière d'une année sur l'autre. Il se conduit facilement et n'exige aucun traitement.

Le fruit

Gros fruits ronds, légèrement aplatis, pouvant atteindre 200 g, à la peau jaune orangé au moment de la cueillette et virant à l'orange vif à pleine maturité. Chair sucrée, parfumée, très appréciées. Récolte d'octobre à décembre, souvent après la chute des feuilles. Se consomme blet, le fruit perd alors son astringence.

Culture

Emplacement ensoleillé et abrité des vents froids, dans un sol profond, riche et bien drainé ; éviter les terres calcaires, qui provoquent la chlorose. Comptez 5 à 7 m entre deux arbres. Arrosages réguliers les deux premières années et paillage du pied des jeunes sujets. Taille légère, pour aérer la charpente. Le froid léger de l'arrière-saison ne nuit pas aux fruits : il aide au contraire à lever l'astringence.

TARIFS

0,8 – 1,2 m	25 €
1,2 – 2 m épuisé	30 €
Plus de 2 m épuisé	35 €

Disponibilités au 24/09/2026

Floraison	Mai à juin
Maturité	Octobre à décembre
Exposition	Soleil
Rusticité	-15°C
Feuillage	Caduc
Strate	Arbre (5 à 6 m)
Pollinisation	Autofertile, mais pollinisateur conseillé
Caractéristiques	Gros fruits, très productif, astringence variable

FRUITIERS GREFFÉS

Pêchers

4 variétés

Nous vous proposons une sélection de pêchers anciens, retenus pour leur tolérance naturelle à la cloque, leur rusticité et la qualité gustative de leurs

fruits. Notre gamme comprend également un nectarinier, dont le fruit à peau lisse se cultive exactement comme une pêche.

Tarifs scion 0,8 – 1,2 m **15 €** · 1,2 – 2 m **20 €** · plus de 2 m **25 €**

GF677

Par ordre de maturité	Floraison	Juin	Juil	Août	Pollinisation	Page
Rouge d'Occitanie 🔗	Printemps, précoce				Autofertile	59
Charles Roux 🔗	Mi-mars – avril, rose				Autofertile	57
Felligni 🔗	Printemps				Autofertile	58
Tournier 🔗	Printemps				Autofertile	60

 récolte consommation**ÉPUISÉ** au 24/09/2026[🔗](#) fiche sur pomaria.fr

Le tableau classe les variétés par date de récolte ; les fiches qui suivent sont rangées par ordre alphabétique.

Charles Roux

Prunus persica

Grosse pêche blanche de fin juillet, tendre et juteuse. Variété française de 1961, résistante à la cloque et peu sensible aux gelées tardives.

TARIFS · SCION RACINES NUES

GF677

0,8 – 1,2 m **15 €** ●

1,2 – 2 m **20 €** ●

Plus de 2 m **25 €** ●

● disponible · ○ épuisé · au 24/09/2026

— L'arbre

Variété française inscrite au catalogue en 1961. L'arbre est vigoureux, très ramifié, au port semi-étalé. Feuillage caduc vert franc, allongé et effilé. Variété résistante à la cloque, à la moniliose et au coryneum. La floraison rose intervient de mi-mars à avril, et la variété se montre peu sensible aux gelées tardives : la variété peut être adaptée aux vergers d'altitude.

— Le fruit

Gros fruit rond d'environ 7 cm de diamètre, à la peau largement rouge sur fond jaune verdâtre. La chair est blanche, ponctuée de rouge autour du noyau, tendre, généreusement juteuse, sucrée et parfumée. Le noyau se détache bien de la chair. Maturité de fin juillet à début août. Elle se déguste fraîche, mais aussi en confitures, compotes ou conserves, grâce à sa douceur et son taux de sucre.

— Culture

Sol léger, profond, sain et bien drainé, sans excès d'eau ; le pêcher redoute le calcaire, qui provoque la chlorose. Exposition ensoleillée. Rusticité de l'ordre de -15 °C. Autofertile, mais la présence d'un second pêcher améliore sensiblement la production. Le pêcher fructifie sur les rameaux d'un ou deux ans, et une branche qui a fructifié ne produit plus : la taille annuelle est donc indispensable pour renouveler le bois. Éclaircir les fruits en laissant une pêche tous les quinze centimètres environ.

Floraison	Mi-mars à avril, rose
Maturité	Fin juillet à début août
Exposition	Soleil
Rusticité	-15°C
Feuillage	Caduc
Strate	Arbre (5 à 6 m)
Pollinisation	Autofertile
Caractéristiques	Résistante à la cloque, peu sensible aux gelées tardives



Felligni

Prunus persica var. nucipersica

Très bonne nectarine, juteuse, sucrée et parfumée, à la chair jaune ferme et aromatique, et l'une des rares nectarines résistantes à la cloque.

TARIFS · SCION RACINES NUES

GF677

0,8 – 1,2 m **15 €** ●

1,2 – 2 m **20 €** ●

Plus de 2 m **25 €** ●

● disponible · ○ épuisé · au 24/09/2026

L'arbre

Variété ancienne d'origine belge, sélectionnée pour sa qualité gustative et sa robustesse. Elle présente une excellente tenue au froid qui permet de la cultiver jusqu'à 1000 m d'altitude. L'arbre est de vigueur moyenne, au port étalé et à croissance rapide, avec la mise à fruit rapide typique de l'espèce. Feuillage caduc vert franc. Très résistant à la cloque.

Le fruit

Nectarine de calibre moyen, à la peau lisse et sans duvet, d'un beau rouge foncé sur fond jaune. La chair est jaune, ferme et fondante à la fois, juteuse et franchement aromatique. Maturité à la mi-août. Consommation fraîche de préférence.

Culture

Sol léger, profond, drainé et non calcaire. Exposition ensoleillée. Autofertile. Sa résistance à la cloque et au froid en fait une variété de choix pour les vergers d'altitude et les régions fraîches, où les nectarines réussissent rarement. Taille annuelle de renouvellement. Éclaircissage des fruits pour tenir le calibre.

Floraison	Printemps
Maturité	Mi-août
Exposition	Soleil
Rusticité	-15°C
Feuillage	Caduc
Strate	Arbre
Pollinisation	Autofertile
Caractéristiques	Nectarine à peau lisse, résistante à la cloque, adaptée à l'altitude

Rouge d'Occitanie



Prunus persica

La première pêche de la saison, dès la mi-juin. Petite pêche blanche veinée de sanguine, remarquablement sucrée pour une variété aussi précoce.

L'arbre

Cette variété méridionale est la plus précoce de notre gamme. Arbre de vigueur moyenne au port étalé et à la croissance rapide, comme tous les pêchers, avec un feuillage caduc vert franc dégageant une légère odeur d'amande au froissement. La mise à fruit est rapide, souvent dès la deuxième année après plantation. Variété sensible à la cloque.

Le fruit

Petite pêche à chair blanche joliment veinée de rouge sanguin. Malgré sa précocité — les variétés hâtives sont souvent décevantes — elle se distingue par une saveur franchement sucrée et une très bonne qualité gustative. Elle ouvre la saison des pêches à la mi-juin, plusieurs semaines avant les variétés d'été. Consommation fraîche.

Culture

Sol léger, profond, drainé, non calcaire. Exposition ensoleillée et si possible abritée. Autofertile. Sa sensibilité à la cloque en fait une variété à réserver aux situations aérées. Taille annuelle de renouvellement, le pêcher fructifiant sur le bois d'un ou deux ans. Éclaircissage des fruits pour tenir le calibre.

TARIFS · SCION RACINES NUES

GF677

0,8 – 1,2 m **15 €** ●

1,2 – 2 m **20 €** ●

Plus de 2 m **25 €** ●

● disponible · ○ épuisé · au 24/09/2026

Floraison	Printemps, précoce
Maturité	Mi-juin
Exposition	Soleil
Rusticité	-15°C
Feuillage	Caduc
Strate	Arbre
Pollinisation	Autofertile
Caractéristiques	La plus précoce, chair sanguine

Tournier

Prunus persica

Pêche à chair blanche d'excellente qualité, mûrissant à la mi-août. L'une des variétés les plus résistantes à la cloque.

TARIFS · SCION RACINES NUES

GF677

0,8 – 1,2 m **15 €** ●

1,2 – 2 m **20 €** ●

Plus de 2 m **25 €** ●

● disponible · ○ épuisé · au 24/09/2026

L'arbre

Variété ancienne de vigueur moyenne, au port étalé, à croissance rapide et à mise à fruit précoce — souvent un à deux ans après la plantation. Feuillage caduc vert franc. Très forte résistance à la cloque.

Le fruit

Pêche à chair blanche, d'excellente qualité gustative : fondante, juteuse et sucrée. Maturité à la mi-août, ce qui en fait une variété de fin de saison dans notre gamme, prolongeant la récolte après Charles Roux. Consommation fraîche, ou en confitures et conserves. Les pêches se conservent mal : à cueillir à maturité et à consommer rapidement.

Culture

Sol léger, profond, sain et bien drainé ; éviter les terres calcaires ou trop caillouteuses. Exposition ensoleillée. Autofertile. Sa résistance à la cloque en fait l'un des pêchers les plus faciles à conduire sans traitement, y compris en région humide. Taille annuelle recommandée pour faciliter la fructification qui se fait sur le bois d'un ou deux ans. Éclaircir la charge pour obtenir des fruits d'un bon calibre.

Floraison	Printemps
Maturité	Mi-août
Exposition	Soleil
Rusticité	-15°C
Feuillage	Caduc
Strate	Arbre
Pollinisation	Autofertile
Caractéristiques	Très résistante à la cloque, chair blanche de qualité

02

Autres fruitiers

Mûriers	7
Figuiers	5
Grenadiers	5
Goumis du Japon	1
Chalefs d'automne	2

Mûriers, figuiers, grenadiers, goumis et chalefs : des arbres et arbustes francs de pied, faciles à conduire, qui trouvent leur place même dans un jardin de taille modeste.

AUTRES FRUITIERS

Mûriers

7 variétés

Nous avons sélectionné parmi les *Morus nigra*, *alba* et *macroura*, des variétés particulièrement intéressantes

pour leur productivité, leur rusticité, la grosseur et la saveur de leurs fruits.

Tarifs Pot 3 L **25 €**

Par ordre de maturité	Floraison	Juin	Juil	Août	Pollinisation	Page
Aureifolia 🔗 ÉPUISÉ	Avril – mai				Autofertile	63
Emmanuelle 🔗	Avril – mai				Autofertile	64
Pakistanaïs 🔗 ÉPUISÉ	Avril – mai (précoce)				Autofertile	68
Taylor 🔗 ÉPUISÉ	Fin avril – déb. mai				Autofertile	69
Fuji Red 🔗 ÉPUISÉ	Mai				Autofertile	65
Full Season 🔗	Printemps				Autofertile	66
Loud Georgeous 🔗 ÉPUISÉ	Printemps				Autofertile	67

récolte

consommation

ÉPUISÉ au 24/09/2026

[🔗](#) fiche sur pomaria.fr

Le tableau classe les variétés par date de récolte ; les fiches qui suivent sont rangées par ordre alphabétique.

Aureifolia

Morus alba

Variété de mûrier blanc à gros fruits blanc-rosés délicieux et intensément parfumés. Arbre vigoureux et très ornemental.

L'arbre

Arbre très vigoureux. Il est surnommé le mûrier à feuilles d'or pour ses magnifiques couleurs dorées automnales.

Le fruit

Variété à gros fruits ronds blancs-rosés. Excellente qualité gustative, très sucrés, très parfumés, mielleux et savoureux. Se mange aussi bien crue, que séchée ou en confitures.

Culture

Cette variété se plante de préférence entre novembre et mars, en situation ensoleillée et protégée des vents froids. Ne craint pas la sécheresse une fois bien implantée. Très adaptable, elle convient aussi bien aux sols riches qu'aux terres plus sèches ou calcaires. Cette arbre supporte très bien la taille. Arbre résistant ne nécessitant aucun traitement.

TARIFS

ÉPUISÉ

Pot anti-chignon - 3L **épuisé** **25 €**

Disponibilités au 24/09/2026

Floraison	Avril à mai
Maturité	Juin
Exposition	Soleil
Rusticité	-20°C
Feuillage	Caduc
Strate	Arbre
Pollinisation	Autofertile
Caractéristiques	Fruits blanc-rosés, très parfumés, ornemental

Emmanuelle

Morus alba

Variété de mûrier blanc réputée pour sa robustesse, sa croissance rapide et ses fruits délicieux.

L'arbre

Cultivar de *Morus alba* originaire d'Europe occidentale, sélectionné pour sa vigueur et sa bonne adaptation aux climats tempérés. Il adopte un port étalé, atteint 5-8 m de hauteur. Variété vigoureuse et facile à cultiver.

Le fruit

Fruit allongé (3cm) blanc-violacé. Sa chair est sucrée et savoureuse, avec un parfum délicat. Excellente crue, séchée ou transformée en confitures. Sa récolte s'étend de fin juin à début juillet.

Culture

Cette variété se plante de préférence entre novembre et mars, en situation ensoleillée et protégée des vents froids. Ne craint pas la sécheresse une fois bien implantée. Très adaptable, elle convient aussi bien aux sols riches qu'aux terres plus sèches ou calcaires. Cette arbre supporte très bien la taille. Arbre résistant ne nécessitant aucun traitement.

TARIFS

Pot anti-chignon - 3L

25 €

Disponibilités au 24/09/2026

Floraison	Avril à mai
Maturité	Juin à juillet
Exposition	Soleil
Rusticité	-20°C
Feuillage	Caduc
Strate	Arbre
Pollinisation	Autofertile
Caractéristiques	Fruits blanc-violacés, très parfumés

Fuji Red

Morus alba

Sélection à gros fruits noirs, au goût savoureux et équilibré, mûrissant en juillet.

L'arbre

Variété originaire de Chine au beau feuillage légèrement lobé. Arbre à croissance rapide, pouvant être formé en arbre ou conduit en buisson.

Le fruit

Longs fruits (2 à 4 cm) au goût bien équilibré, sucré avec une pointe d'acidité, au goût agréable évoquant les fruits rouges. Ils prennent une teinte rouge foncé à maturité, de début juillet à début septembre. Excellent fruit de bouche, également utilisé en confiture.

Culture

Le mûrier ne craint pas la sécheresse une fois bien raciné. Il préfère des sols profonds et riches mais s'adapte aux sols pauvres et calcaires. La mise à fruit est rapide (2 à 3 ans après plantation). Les feuilles peuvent être utilisées comme fourrage.

TARIFS

ÉPUISÉ

Pot anti-chignon - 3L **épuisé** **25 €**

Disponibilités au 24/09/2026

Floraison	Mai
Maturité	Juillet
Exposition	Soleil
Rusticité	-20°C
Feuillage	Caduc
Strate	Arbre
Pollinisation	Autofertile
Caractéristiques	Couleur foncée, rustique, productif

Mûriers

Autres fruitiers

Full Season

Morus alba

Mûrier nain ne dépassant pas 2 m, au port buissonnant et très productif. La seule variété de la gamme adaptée aux petits jardins et à la cueillette sans échelle.

L'arbre

Full Season, aussi diffusée sous le nom de Four Seasons, est une variété taïwanaise de mûrier blanc dont la particularité est le format : un mûrier nain au port compact et buissonnant, qui ne dépasse pas 2 m. C'est peu commun dans un genre où les sujets dépassent couramment 7 ou 10 m et imposent une échelle à la récolte. Elle est en outre très productive pour sa taille.

Son nom renvoie à une fructification qui s'étale sur presque toute l'année sous les climats subtropicaux dont elle est originaire ; sous nos latitudes, cette période reste bien plus courte — la récolte s'étale sur l'été, comme chez les autres mûriers.

Le fruit

Fruits allongés composés de nombreuses petites drupes, sombres à maturité. Saveur sucrée et parfumée, dans le registre doux des mûriers blancs. Récolte étalée sur l'été, au fil de la pousse des rameaux. Fruits fragiles, à consommer rapidement après cueillette.

Culture

Sol ordinaire drainant, exposition ensoleillée. Fructification sur le bois de l'année : taille hivernale possible sans perte de récolte, et facile à maintenir en buisson bas. Autofertile. Son format en fait un excellent candidat pour un petit jardin, une haie fruitière basse ou une culture en grand bac.

TARIFS

Pot anti-chignon - 3L

25 €

Disponibilités au 24/09/2026

Floraison	Printemps
Maturité	Été, sur plusieurs semaines
Exposition	Soleil
Rusticité	-20°C
Feuillage	Caduc
Strate	Arbuste (2 m)
Pollinisation	Autofertile
Caractéristiques	Format nain, très productif, petits jardins

Loud Georgeous

Morus multicaulis

Variété remarquablement productive et précoce, aux fruits ronds rouge vif puis noirs, à la saveur sucrée et nettement framboisée.

L'arbre

Mûrier rattaché à *Morus multicaulis*, autrefois massivement cultivé pour la sériciculture — ses feuilles, très grandes, larges et fines, au limbe tendre, étaient recherchées pour l'élevage du ver à soie. L'arbre est précoce et extrêmement fructifère : c'est, de l'avis de plusieurs collectionneurs, le plus productif du genre. Croissance rapide, feuillage caduc généreux. Conduite basse mieux adaptée pour cet arbre dont les branches peuvent être assez cassantes.

Le fruit

Fruit de taille moyenne, rond, à grains irréguliers, rouge vif puis noir à maturité. La saveur est excellente : sucrée, moyennement acidulée, avec une note framboisée très reconnaissable qui fait la réputation de la variété. Récolte précoce dans la saison des mûriers. Le fruit supporte assez mal la pluie pendant la maturation. Dans les régions à étés humides, la variété donnera le meilleur d'elle-même les années sèches.

Culture

Sol ordinaire, bien drainé, exposition ensoleillée. Fructification sur le bois de l'année : taille hivernale possible sans perte de récolte, et vivement conseillée ici pour compenser la faible tenue des rameaux — conduite en trogne, en cépée ou en gobelet bas. La variété est un peu plus frileuse que les mûriers blancs classiques et donnera de meilleurs résultats en climat doux qu'en situation froide et humide.

TARIFS

ÉPUISÉ

Pot anti-chignon - 3L **épuisé** **25 €**

Disponibilités au 24/09/2026

Floraison	Printemps
Maturité	Début d'été, précoce
Exposition	Soleil
Rusticité	-20°C
Feuillage	Caduc
Strate	Arbre
Pollinisation	Autofertile
Caractéristiques	Très productif, précoce, saveur framboisée

Pakistanaïs

Morus macroura

Le mûrier pakistanaïs est recherché pour sa qualité gustative supérieure et la taille spectaculaire de ses fruits. A consommer en juin.

— L'arbre

Originaire des régions tempérées et subtropicales d'Asie (Himalaya, Pakistan, nord de l'Inde), *Morus macroura* est un arbre au port élancé et à la croissance rapide, pouvant atteindre 4 à 6 mètres s'il n'est pas taillé. Il se distingue par son feuillage décoratif et sa grande vigueur. Il est moins rustique que *Morus alba* mais peut résister jusqu'à -15°C en situation abritée.

— Le fruit

Les fruits sont grands, très allongés (jusqu'à 5-6 cm), de couleur rouge foncé à noire à maturité. Leur chair est fondante, parfumée, très sucrée et légèrement acidulée. Ils se dégustent frais ou peuvent être transformés (jus, confitures, fruits séchés).

— Culture

À planter de préférence au printemps pour favoriser un bon enracinement avant l'hiver. Ce mûrier apprécie les climats doux et les expositions chaudes et abritées du vent froid. Il préfère un sol riche, profond et bien drainé. Variété sensible aux gels tardifs les premières années, mais pousse très vigoureusement dès que les températures sont favorables. Autofertile et très productif. Les feuilles peuvent être utilisées comme fourrage.

TARIFS

ÉPUISÉ

Pot anti-chignon - 3L **épuisé** **25 €**

Disponibilités au 24/09/2026

Floraison	Avril à mai (précoce)
Maturité	Juin
Exposition	Soleil
Rusticité	-15°C
Feuillage	Caduc
Strate	Arbre
Pollinisation	Autofertile
Caractéristiques	Fruits très longs et sucrés, forte production

Taylor

Morus alba

Variété rustique aux fruits sucrés, non tachants. Excellente tolérance à la sécheresse.

L'arbre

Le mûrier blanc 'Taylor' est une sélection nord-américaine de *Morus alba*, appréciée pour sa vigueur, sa productivité et sa rusticité. Il forme un arbre de taille moyenne à grande, au port arrondi, dense, et au feuillage caduc large et décoratif. Croissance rapide.

Le fruit

Fruits longs (2,5 et 4 cm), légèrement translucides, blanc à jaune pâle. Leur goût est très doux, proche du miel, sans acidité. Très agréable, frais ; adapté également au séchage ou confiture.

Culture

Cette variété se plante de préférence entre novembre et mars, en situation ensoleillée. Ne craint ni le froid ni la sécheresse une fois bien implantée. Très adaptable, elle convient aussi bien aux sols riches qu'aux terres plus sèches ou calcaires. La fructification intervient généralement tôt, dès les premières années. Arbre résistant ne nécessitant aucun traitement.

TARIFS

ÉPUISÉ

Pot anti-chignon - 3L **épuisé** **25 €**

Disponibilités au 24/09/2026

Floraison	Fin avril à début mai
Maturité	Fin juin à début juillet
Exposition	Soleil
Rusticité	-20°C
Feuillage	Caduc
Strate	Arbre
Pollinisation	Autofertile
Caractéristiques	Fruits non tachants, très sucrés

AUTRES FRUITIERS

Figuiers

Ficus carica · 5 variétés

Le figuier est un arbre fruitier emblématique des climats méditerranéens, mais certaines variétés s'adaptent très bien à des zones plus fraîches. C'est le cas de notre sélection qui fructifie très bien dans l'Ain. Le figuier offre une production généreuse et sans

alternance. C'est un arbre peu exigeant, résistant bien à la sécheresse une fois établi. Il est facile à cultiver et s'accommode de nombreux types de sols. C'est par ailleurs un arbre qui tolère bien la taille.

Tarifs Pot 3 L **20 €**

Par ordre de maturité	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Pollinisation	Page
Mischurinska 10 🔗						Autofertile	74
Dalmatie 🔗						Autofertile	71
Encanto Honey 🔗						Autofertile	73
Desert King 🔗						Autofertile	72
Pastilière 🔗						Autofertile	75

 récolte consommation**ÉPUISÉ** au 24/09/2026[🔗](#) fiche sur pomaria.fr

Le tableau classe les variétés par date de récolte ; les fiches qui suivent sont rangées par ordre alphabétique.

Dalmatie

Ficus carica

Figues de gros calibre à peau vert-jaune et à chair rouge, sucrée et savoureuse. Variété bifère exceptionnellement résistante au froid et à l'humidité. Variété de petit développement, idéale pour les petits jardins. Récolte en juillet puis en septembre/octobre.

— L'arbre

Figuier au port compact, de petit développement. Ses rameaux fins portent un feuillage très découpé, profondément lobé et décoratif. D'une rusticité exceptionnelle, il supporte des températures jusqu'à -15°C à -18°C. Cette variété bifère produit deux récoltes distinctes : les figues-fleurs précoces de fin juin à mi-juillet, puis les figues d'automne de mi-août à mi-octobre.

— Le fruit

Ce figuier se distingue par ses figues de belle taille à la peau vert-jaune. Leur chair rouge vif, bien charnue, juteuse et particulièrement sucrée offre une saveur riche et équilibrée. Les fruits se dégustent frais ou se prêtent parfaitement aux préparations culinaires sucrées et salées.

— Culture

Variété autofertile de culture facile, qui s'épanouit dans tous types de sols (même humides), en exposition ensoleillée. Il demande peu d'entretien et résiste au sec une fois bien établi. La plantation s'effectue idéalement d'octobre à mars. De part son développement modéré (2,5 à 4 mètres de diamètre pour 2 à 3 mètres de hauteur en pleine terre), il est également adapté à la culture en pot.

TARIFS

Pot anti-chignon - 3L

20 €

Disponibilités au 24/09/2026

Floraison	Invisible (fleurs internes)
Maturité	Fin juin à mi-juillet puis mi-août à mi-octobre (bifère)
Exposition	Soleil
Rusticité	-15°C à -18°C
Feuillage	Caduc
Strate	Arbre
Pollinisation	Autofertile
Caractéristiques	Petit développement, bifère, très résistant au froid

Desert King

Ficus carica

Variété bifère de référence pour les étés courts. Grosses figues-fleurs à peau vert-jaune et chair rouge fraise, fondantes et miellées, récoltées dès fin juillet. Rustique jusqu'à -15 °C.

— L'arbre

Variété américaine découverte vers 1930 près de Madera, en Californie, et devenue populaire dans le nord-ouest des États-Unis. C'est un figuier bifère de type San Pedro, atteignant 4 à 5 m, à la croissance vigoureuse et aux branches verticales qui dépassent souvent la couverture du feuillage — ce qui lui donne une silhouette un peu grêle et aérée. Pincer les jeunes branches pour le faire ramifier améliore nettement son port. Sa résistance est son argument majeur : jusqu'à -15 °C, avec une bonne tolérance aux printemps froids, aux à-coups thermiques et au vent. Une finesse qui compte : ses figues-fleurs passent l'hiver à l'état de bourgeons, là où d'autres bifères développent de jeunes figues dès l'automne, que le gel détruit.

— Le fruit

La récolte principale est celle des figues-fleurs, ou brebas, et elle est très fiable. Les fruits sont gros, en forme de poire, à la peau passant du vert clair au jaune pâle à maturité. La chair est rouge fraise, très juteuse, fondante, franchement sucrée, avec des notes miellées et de fruits rouges ; les graines s'y remarquent à peine. La cueillette intervient fin juillet à début août selon les régions. C'est cette précocité et cette fiabilité qui font de Desert King la variété bifère recommandée pour les climats à été court, et les régions fraîches, là où beaucoup de figuiers peinent à mûrir.

— Culture

Sol drainé, exposition ensoleillée et si possible abritée. Le figuier supporte la sécheresse mais apprécie l'eau : un arrosage de soutien pendant le grossissement des fruits améliore le calibre. Taille de fin d'hiver pour supprimer les rameaux qui encombrant le centre et les rejets de la base. Culture en pot possible en climat très froid.

TARIFS

Pot anti-chignon - 3L

20 €

Disponibilités au 24/09/2026

Floraison	Invisible (fleurs internes)
Maturité	Fin juillet à mi-août (figues-fleurs)
Exposition	Soleil
Rusticité	-15°C
Feuillage	Caduc
Strate	Petit arbre (4 à 5 m)
Pollinisation	Autofertile pour la récolte de figues-fleurs
Caractéristiques	Précoce et fiable, gros fruits, adaptée aux étés courts

Encanto Honey

Ficus carica

Figue vert-jaune à pulpe ambrée couleur miel, presque sans pépins, d'une douceur exceptionnelle. Deux récoltes par an, en juillet puis en septembre.

— L'arbre

Variété américaine sélectionnée et diffusée par Jon Verdick, fondateur de la pépinière Encanto Farms à San Diego, en Californie. C'est un figuier bifère (il donne deux récoltes par an — les figues-fleurs en juillet sur le bois de l'année précédente, puis la récolte principale en septembre) et de type commun, donc parthénocarpique : contrairement aux figuiers de type San Pedro, il n'a pas besoin d'être pollinisé. On le distingue au premier coup d'œil par ses feuilles presque entières, juste légèrement trilobées. L'arbre reste de développement modéré et s'accommode bien de la culture en pot, ce qui en fait un bon choix pour une terrasse ou un petit jardin.

— Le fruit

Figue de calibre moyen, dont la peau reste vert-jaune à maturité. La chair est ambrée, d'un beau ton miel, fondante, et quasiment dépourvue de pépins. La saveur est franchement mielleuse, très sucrée et parfumée, sans acidité, d'une grande douceur. Première récolte en juillet, avec les figues-fleurs, généralement plus grosses ; seconde récolte, la principale, en septembre. Comme toutes les figues, elles se cueillent à pleine maturité, quand le fruit s'incline sur son pédoncule et qu'une goutte de sirop perle à l'œil.

— Culture

Sol drainé, même pauvre et caillouteux ; le figuier redoute l'excès d'humidité hivernale. Exposition ensoleillée et abritée, idéalement contre un mur exposé au sud, dont la chaleur restituée avance la maturité. Il supporte la sécheresse une fois installé mais produit mieux avec un arrosage de soutien en été. Taille de fin d'hiver, légère, pour aérer le centre et supprimer les rejets de souche. Une qualité peu commune mérite d'être signalée : cette variété tient bien la pluie, là où beaucoup de figuiers voient leurs fruits se fendre ou fermenter après un épisode humide en fin de saison.

TARIFS

Pot anti-chignon - 3L

20 €

Disponibilités au 24/09/2026

Floraison	Invisible (fleurs internes)
Maturité	Juillet (figues-fleurs) puis septembre
Exposition	Soleil
Rusticité	-12°C
Feuillage	Caduc
Strate	Petit arbre (3 à 5 m)
Pollinisation	Autofertile
Caractéristiques	Chair miel presque sans pépins, bifère, résiste à la pluie

Mischurinska 10

Ficus carica

Petites figes à peau rugueuse marron-violet et chair rouge-orangée, fondante et parfumée. Variété bifère d'origine bulgare, exceptionnellement résistante au froid. Variété de développement modéré, récolte en juillet puis en septembre.

— L'arbre

Variété ancienne d'origine bulgare. Il s'agit d'un cultivar robuste, pouvant atteindre jusqu'à 4 mètres de haut pour 6 mètres de large en plein développement, s'il n'est pas taillé. Figuier d'une rusticité exceptionnelle (-17 à -19°C), probablement la figue de bonne qualité la plus résistante au froid. Variété bifère produisant deux récoltes : les figes-fleurs précoces fin juin, puis les figes d'automne de mi-août à mi-septembre.

— Le fruit

Figes de taille moyenne d'environ 50g à la peau rugueuse de couleur marron-violet. Leur chair rouge-orangée est excellente : fondante et parfumée. Les fruits se dégustent frais.

— Culture

Variété de culture facile, qui s'épanouit dans tous types de sols, en exposition ensoleillée. Vigoureux et très productif, ce figuier demande peu d'entretien et résiste au sec une fois bien établi. Il est adapté aux climats rigoureux grâce à sa résistance exceptionnelle au froid. La plantation s'effectue idéalement d'octobre à mars.

TARIFS

Pot anti-chignon - 3L

20 €

Disponibilités au 24/09/2026

Floraison	Invisible (fleurs internes)
Maturité	Fin juin puis mi-août à mi-septembre (bifère)
Exposition	Soleil
Rusticité	-17°C à -19°C
Feuillage	Caduc
Strate	Arbre
Pollinisation	Autofertile
Caractéristiques	Très productif, très résistant au froid

Pastilière

Ficus carica

Figues de calibre moyen à peau noir-violet et chair rouge foncé, fine et juteuse. Variété unifère (une seule fructification) précoce et résistante au froid. Arbre de petit développement, idéal pour les petits jardins et pouvant s'adapter à la culture en pot. Récolte de début août à fin septembre.

L'arbre

Le figuier Pastilière (également appelé Rouge de Bordeaux), est originaire du Japon. Il a transité par l'Italie avant d'être cultivé dans le Sud-Ouest de la France. Arbre buissonnant unifère à faible développement atteignant environ 3 mètres de hauteur. Il possède un tronc court et tortueux, avec une écorce lisse de couleur grisâtre. Les feuilles sont grandes, palmées et lobées, d'un vert vif. Il a une bonne résistance au froid et réussit bien partout en France, jusqu'à 600 mètres d'altitude. Récolte entre début août et fin septembre.

Le fruit

Figues de calibre moyen (environ 60 à 70 g) et de forme pyriforme caractéristique. La peau vire du violet foncé au noir à maturité, tandis que la chair rouge foncé est fine, juteuse et très savoureuse. Du point de vue gustatif, le fruit offre une saveur douce, subtilement parfumée. Les fruits se dégustent frais ou transformés.

Culture

Variété autofertile de culture facile, qui préfère les sols drainants et calcaires. Elle s'épanouit en exposition ensoleillée recommandée. L'arbre demande peu d'entretien et résiste au sec une fois bien établi. La plantation s'effectue idéalement d'octobre à mars.

TARIFS

Pot anti-chignon - 3L

20 €

Disponibilités au 24/09/2026

Floraison	Invisible (fleurs internes)
Maturité	Août à septembre (unifère)
Exposition	Soleil
Rusticité	-15°C à -17°C
Feuillage	Caduc
Strate	Arbre
Pollinisation	Autofertile
Caractéristiques	Unifère, précoce, adapté petits jardins

AUTRES FRUITIERS

Grenadiers

Punica granatum · 5 variétés

Le grenadier est un arbuste ou petit arbre fruitier remarquable par sa floraison éclatante et sa production de fruits savoureux et riches en antioxydants. Facile d'entretien, le grenadier supporte bien la sécheresse

estivale. Il est particulièrement adapté aux climats chauds et secs, mais nous avons sélectionné pour vous des variétés ayant une rusticité exceptionnelle et qui se comportent très bien dans l'Ain.

Tarifs Pot 3 L **25 €**

Par ordre de maturité	Floraison	Sept	Oct	Nov	Pollinisation	Page
Agat 🔗	Mai – juin				Autofertile	77
Hyrdonar x kiemizy Ak Bah 🔗	Juin				Autofertile	78
Parfianka 🔗	Juin				Autofertile	80
Sumbar 🔗	Mai – juillet				Autofertile	81
Kazake 🔗	Mai – juillet				Autofertile	79

 récolte consommation**ÉPUISÉ** au 24/09/2026[🔗](#) fiche sur pomaria.fr

Le tableau classe les variétés par date de récolte ; les fiches qui suivent sont rangées par ordre alphabétique.



Agat

Punica granatum

Grenadier nain d'origine russe, très résistant au froid et précoce. Fruits rouge clair à pépins petits et tendres, d'une excellente saveur acidulée. Idéal en pot ou en petit jardin.

— L'arbre

Arbuste buissonnant à faible développement, au port compact et au feuillage caduc vert vif et brillant, qui vire au jaune doré avant de tomber. Agat est une variété d'origine russe, issue d'Asie centrale, sélectionnée dans une région où le grenadier doit composer avec des hivers autrement plus rudes que ceux du bassin méditerranéen. Elle en tire ses deux atouts : la rusticité et la précocité. Sa taille réduite la rend adaptée aux petits jardins et à la culture en contenant, y compris en climat frais, et elle supporte la neige. Floraison en fleurs simples orange en mai-juin.

— Le fruit

Grenades de bonne taille, rouge clair, produites en abondance — l'arbuste est très productif. La variété est dite « sans pépins » : les graines sont bien présentes, mais petites et tendres. La saveur est sucrée et joliment acidulée, de très bonne qualité. Maturité en septembre-octobre, idéale pour les régions à été court, là où les variétés méditerranéennes classiques restent vertes.

— Culture

Exposition ensoleillée et abritée, sol drainé — le grenadier tolère une large gamme de sols, y compris calcaires et modérément salins, à condition qu'ils ne retiennent pas l'eau. Autofertile. Variété parmi les plus rustiques : résistance au froid annoncée autour de -14 °C, certaines sources allant jusqu'à -17 °C pour cette variété, ce qui la place nettement au-dessus des grenadiers ordinaires. En pot, arrosages réguliers en saison et hivernage à l'abri des gelées prolongées.

TARIFS

Pot anti-chignon - 3L

25 €

Disponibilités au 24/09/2026

Floraison	Mai à juin
Maturité	Septembre à octobre
Exposition	Soleil
Rusticité	-14°C
Feuillage	Caduc
Strate	Arbuste (1,50 à 2 m)
Pollinisation	Autofertile
Caractéristiques	Petit développement, précoce, très rustique, pépins tendres

Hyrdonar x kiemizy Ak Bah

Punica granatum

Cet hybride iranien est une variété de faible développement, très résistante au froid. Grenades à peau rouge sucrées et savoureuses. Maturité précoce, récolte en septembre.

— L'arbre

Hybride de 2 grenadiers de la région d'Iran, développé pour des vergers de haute densité. Arbuste à petit développement. De forme compacte, il atteint environ 2 à 3 mètres de hauteur à maturité. Très bonne rusticité permettant une culture dans la plupart des régions françaises. Port naturellement érigé et dense, idéal pour les espaces restreints. Forte productivité.

— Le fruit

Fruits sont de taille moyenne, avec une production importante. Les grenades présentent une peau rouge à rouge foncé à maturité, avec un jus sucré et savoureux. La précocité de cette variété permet une maturation complète même dans les régions moins favorables aux grenadiers. Les fruits se dégustent frais, en jus ou se prêtent parfaitement aux préparations culinaires.

— Culture

Variété autofertile de culture facile, qui s'adapte à différents types de sols mais préfère les terres bien drainées. Exposition ensoleillée recommandée pour une fructification optimale. Résistance remarquable au froid. Il peut s'adapter à la culture en pot grâce à son petit développement. La plantation s'effectue idéalement au début du printemps ou à l'automne.

TARIFS

Pot anti-chignon - 3L

25 €

Disponibilités au 24/09/2026

Floraison	Juin
Maturité	Septembre (précoce)
Exposition	Soleil
Rusticité	-15°C à -18°C
Feuillage	Caduc
Strate	Arbre
Pollinisation	Autofertile
Caractéristiques	Port compact, très productif, précoce



Kazake

Punica granatum

L'un des grenadiers les plus résistants au froid. Gros fruits à peau vert-jaune, arilles rouge foncé et jus remarquablement sucré. Résistant à l'éclatement et de bonne conservation.

L'arbre

Variété d'Asie centrale — les sources hésitent entre Kazakhstan et Ouzbékistan —, introduite dans nos régions dans les années 1990 et sélectionnée pour sa résistance au froid. Kazake figure parmi les grenadiers les plus rustiques disponibles, ce qui repousse nettement vers le nord la limite de culture de cette espèce méditerranéenne.

L'arbuste est buissonnant et vigoureux, atteignant environ 3 m de haut pour 2 m de large. La floraison rouge orangé, de mai à juillet, est spectaculaire et se prolonge une bonne partie de l'été. Il résiste très bien à la sécheresse une fois installé, et n'est sensible à aucune maladie particulière.

Le fruit

Grosses grenades à la peau épaisse, vert-jaune parfois lavée de rose à maturité. Les arilles sont rouge foncé, juteux, d'une saveur aigre-douce franchement sucrée, à pépins durs. Grâce à sa peau épaisse, les fruits résistent très bien à l'éclatement et se conservent longtemps après récolte. Récolte en octobre-novembre.

Variété idéale pour la consommation en jus, d'un beau rouge clair, doux et sucré.

Culture

Plein soleil indispensable, dans un emplacement abrité des vents glacés. Sol drainant, même pauvre ou calcaire ; le grenadier n'apprécie pas l'humidité stagnante et supporte très bien la sécheresse. Autofertile, un seul pied suffit, mais la présence d'un second grenadier améliore la nouaison. Taille légère pour aérer la silhouette et stimuler la fructification. Les jeunes plants demandent une protection hivernale les deux ou trois premières années, le temps que le bois durcisse : la rusticité annoncée vaut pour un sujet adulte et bien aoûté.

TARIFS

Pot anti-chignon - 3L

25 €

Disponibilités au 24/09/2026

Floraison	Mai à juillet
Maturité	Octobre à novembre
Exposition	Soleil
Rusticité	-18°C
Feuillage	Caduc
Strate	Arbuste (3 m)
Pollinisation	Autofertile
Caractéristiques	Très rustique, résistant à l'éclatement, excellent en jus

Parfianka

Punica granatum

Grenades de gros calibre à peau rouge grenat et jus rouge lie de vin, pratiquement sans pépins. Variété très résistante au froid et vigoureuse. Arbre de développement moyen. Récolte de septembre à octobre.

— L'arbre

Cette variété originaire du Turkmenistan, est une des variétés les plus résistantes au froid parmi les grenadiers fruitiers (-15 à -18°C). C'est un arbuste caduc vigoureux et productif atteignant 3 à 4 mètres de hauteur à maturité. Il possède un port buissonnant gracieux avec des branches légèrement épineuses.

— Le fruit

Grenade de gros calibre, rouge foncé, aux pépins souples, offrant un jus doux et sucré. La peau est d'un beau rouge grenat écarlate à maturité. Le goût est complexe : sucré, avec une petite âpreté qui fait penser au vin. Les fruits sont résistants à l'éclatement et se conservent bien. Récolte de septembre à octobre selon les conditions climatiques. Les grenades se dégustent fraîches, en jus ou se prêtent parfaitement aux préparations culinaires et pâtisseries.

— Culture

Variété autofertile de culture facile, qui s'adapte à différents types de sols mais préfère les terres bien drainées. Exposition ensoleillée est recommandée pour une fructification optimale. Il demande peu d'entretien et résiste bien à la sécheresse une fois établi. La plantation s'effectue idéalement au printemps ou à l'automne. Arbre à la fois fruitier et ornemental, apprécié pour sa floraison rouge-orangé spectaculaire au printemps.

TARIFS

Pot anti-chignon - 3L

25 €

Disponibilités au 24/09/2026

Floraison	Juin
Maturité	Septembre à octobre
Exposition	Soleil
Rusticité	-15°C à -18°C
Feuillage	Caduc
Strate	Arbre
Pollinisation	Autofertile
Caractéristiques	Très résistant au froid, gros fruits, pépins mous



Sumbar

Punica granatum

Grenade à grains mous et jusqu'à 20 % de sucre, très agréable en consommation directe. Maturité précoce et grande rusticité en font le grenadier des climats à été court.

L'arbre

Variété originaire de la vallée de Sumbar en Iran du nord et sud Turkménistan — une région de montagnes sèches où le grenadier pousse à l'état sauvage depuis toujours, et d'où proviennent les variétés les plus résistantes au froid. Elle figure parmi les plus rustiques de toute la collection française.

L'arbuste est vigoureux et forme un grand buisson au port évasé. La floraison rouge orangé, spectaculaire, s'étale de mai à juillet. Comme tous les grenadiers, il résiste remarquablement à la sécheresse une fois installé et n'est sensible à aucune maladie particulière.

Sa maturité précoce est son atout décisif sous nos climats. Le grenadier a besoin d'un été long et chaud pour mener ses fruits à terme, mais Sumbar parvient à fructifier dans notre région.

Le fruit

Grosses grenades à la peau jaune lavée de rose à maturité. Le jus est en revanche d'un rouge foncé profond, et la teneur en sucre atteint 20 %, ce qui en fait une grenades particulièrement douce.

Fruit de grains mous facile à déguster, idéal pour une consommation directe. Récolte à l'automne, avant les premières gelées.

Culture

Plein soleil indispensable, dans un emplacement abrité des vents glacés. Sol drainant, même pauvre ou calcaire ; le grenadier a du mal avec l'humidité stagnante. Autofertile, un seul pied suffit, mais un second grenadier améliore la nouaison. Taille légère pour aérer la silhouette. Les jeunes plants demandent une protection hivernale les deux ou trois premières années, le temps que le bois durcisse : la rusticité annoncée vaut pour un sujet adulte et bien aoûté, et les gelées tardives de printemps, quand la sève est remontée, font plus de dégâts qu'un froid de plein hiver.

TARIFS

Pot anti-chignon - 3L

25 €

Disponibilités au 24/09/2026

Floraison	Mai à juillet
Maturité	Septembre à octobre
Exposition	Soleil
Rusticité	-15°C
Feuillage	Caduc
Strate	Arbuste (3 m)
Pollinisation	Autofertile
Caractéristiques	Grains mous, 20 % de sucre, maturité précoce

AUTRES FRUITIERS

Goumis du Japon

Elaeagnus multiflora · 1 variétés

Arbuste rustique de 2 à 3 m qui enrichit le sol en azote.
Ses petites baies rouges, acidulées puis sucrées à

pleine maturité, se récoltent en fin d'été.

Tarifs Racines nues **20 €**

Par ordre de maturité	Floraison	Août	Sept	Oct	Pollinisation	Page
-----------------------	-----------	------	------	-----	---------------	------

Sweet Scarlet [🔗](#)**ÉPUISÉ**

Avril – mai



Autofertile

83

récolte

consommation

ÉPUISÉ au 24/09/2026[🔗](#) fiche sur pomaria.fr

Le tableau classe les variétés par date de récolte ; les fiches qui suivent sont rangées par ordre alphabétique.

Sweet Scarlet

Elaeagnus multiflora

Fruits rouges écarlates de la taille d'une cerise, sucrés et savoureux qui se récoltent en été. Sélection ukrainienne rustique et productive, fixatrice d'azote.

Description

Sélection ukrainienne à gros fruits rouges écarlates de la taille d'une petite cerise. C'est un arbuste vigoureux au port ample et dense atteignant 2 à 3 mètres en tous sens. Les fruits sont abondants, bons, sucrés et légèrement acidulés. Les goumis sont riches en vitamines C et E, antioxydants et lycopène. C'est une plante compagne intéressante, grâce à sa capacité à fixer l'azote dans le sol.

Culture

Arbuste facile de culture qui s'adapte à tout type de sol. Il a besoin d'une exposition ensoleillée. Convient parfaitement pour haie libre et gourmande, en isolé ou en grand bac. Sweet Scarlet est autofertile mais la présence de plusieurs pieds assure de meilleures récoltes. Plantation d'octobre à mars.

TARIFS

ÉPUISÉ

Plant en racines nues **épuisé** **20 €**

Disponibilités au 24/09/2026

Floraison	Avril à mai
Maturité	Août à septembre
Exposition	Soleil
Rusticité	-20°C
Feuillage	Caduc à semi-persistant
Strate	Arbuste (2 à 3 m)
Pollinisation	Autofertile
Caractéristiques	Fixateur d'azote, gros fruits, mellifère

AUTRES FRUITIERS

Chalefs d'automne

Elaeagnus umbellata · 2 variétés

Cousin du goumi, plus vigoureux, il forme une belle haie fruitière et fixe lui aussi l'azote. Ses baies rouges

ponctuées d'argent mûrissent à l'automne.

Tarifs Racines nues **20 €**

Par ordre de maturité	Floraison	Sept	Oct	Nov	Pollinisation	Page
-----------------------	-----------	------	-----	-----	---------------	------

Fortunella [🔗](#) **ÉPUISÉ** Avril – juin, parfumée et mellifère **Autostérile** 85

Red Milan [🔗](#) **ÉPUISÉ** Mai **Autofertile** 86

récolte consommation **ÉPUISÉ** au 24/09/2026 [🔗 fiche sur pomaria.fr](#)

Le tableau classe les variétés par date de récolte ; les fiches qui suivent sont rangées par ordre alphabétique.

Fortunella

Elaeagnus umbellata

Baies dorées de la taille d'une grosse groseille, sucrées et moins astringentes que les rouges. Jusqu'à 3 à 4 kg par pied dès la troisième année, arbuste facile de culture.

L'arbre

Le chalef d'automne est un grand arbuste caduc originaire de l'Himalaya et d'Asie orientale, à croissance rapide, atteignant 2,50 à 4 m de haut pour 2 à 3 m d'envergure, au port dressé puis évasé et touffu. Son feuillage est sa signature : vert dessus, argenté dessous, les jeunes pousses couvertes d'écailles métalliques — un buisson qui se remarque de loin. La floraison d'avril à juin est discrète avec un parfum de miel qui se perçoit à plusieurs mètres ; elle est très mellifère et nectarifère.

'Fortunella' est une sélection suisse, issue de la série Pointilla, retenue pour ses fruits jaunes. C'est une plante pionnière, capable de prospérer en sol médiocre, en plein vent et en bord de mer, et qui n'est sensible à aucune maladie ni à aucun ravageur particulier.

Le fruit

Petites baies dorées de la taille d'une belle groseille, environ 8 mm, charnues et piquetées d'argent. Elles sont sucrées et légèrement acidulées, moins astringentes et légèrement plus grosses que celles des variétés à fruits rouges. L'astringence résiduelle disparaît à pleine maturité : à cueillir bien mûres, en septembre. Le noyau est comestible. Consommation fraîche ou en confitures. La productivité est remarquable : 3 à 4 kg par pied dès la troisième année.

Culture

Tous types de sols, du sableux à l'argileux, du légèrement calcaire à l'acide, avec une préférence pour les terres profondes et drainées ; il résiste bien à la sécheresse. Exposition plein soleil recommandé pour cet arbre pionnier. Il supporte parfaitement les tailles sévères, ce qui en fait un excellent sujet de haie fruitière, de brise-vent ou de jardin-forêt. Point important : le chalef d'automne est autostérile. Il faut planter au moins deux variétés différentes à proximité pour obtenir des fruits — certaines sélections sont données partiellement autofertiles, mais la production reste bien meilleure en pollinisation croisée. Un bon paillage à la plantation et une surveillance des besoins en eau les premières années.

TARIFS

ÉPUISÉ

Plant en racines nues **épuisé** **20 €**

Disponibilités au 24/09/2026

Floraison	Avril à juin, parfumée et mellifère
Maturité	Septembre à fin octobre
Exposition	Soleil à mi-ombre
Rusticité	-25°C
Feuillage	Caduc
Strate	Arbuste (2,50 à 4 m)
Pollinisation	Autostérile — planter deux variétés différentes
Caractéristiques	Fruits jaunes peu astringents, très productif, plante pionnière

Red Milan

Elaeagnus umbellata

Fruits rouges piquetés d'argent au goût agréable, riches en vitamines. Cet arbuste est fixateur d'azote, idéal pour des plantations en haie fruitière ou jardin-forêt. Arbuste vigoureux à floraison parfumée très mellifère. Récolte d'automne.

Description

Arbuste caduc ramifié et touffu à la croissance rapide, pouvant atteindre 3 à 4 mètres de hauteur. Floraison en mai, très odorante en ombelles de petites fleurs crème-jaune attirant les abeilles. Produit des fruits rouges piquetés d'argent, comestibles et savoureux comme des bonbons, riches en vitamines C et E, lycopène et antioxydants. Feuillage argenté dessous et vert dessus, semi-persistant.

Culture

Arbuste facile de culture, très résistant à la sécheresse et qui s'adapte à tous types de sols, avec une exposition plein-soleil. Supporte très bien la taille. Cette variété est autofertile mais la pollinisation croisée améliore les récoltes. Plantation d'octobre à mars. Fruits récoltés en automne quand ils sont bien rouges.

TARIFS

ÉPUISÉ

Plant en racines nues **épuisé** **20 €**

Disponibilités au 24/09/2026

Floraison	Mai
Maturité	Septembre à octobre
Exposition	Soleil
Rusticité	-25°C
Feuillage	Caduc à semi-persistant
Strate	Arbuste (2,5 à 4 m)
Pollinisation	Autofertile
Caractéristiques	Fixateur d'azote, mellifère

03

Petits fruits

Groseilliers à grappes	8
Groseilliers à maquereau	5
Cassissiers	4
Casseilliers	2
Vignes	5
Ronce frutière (sans épine)	1
Gojis	3

Groseilliers, cassissiers, casseilliers, vignes et gojis : des arbustes productifs dès les premières années, parfaits en haie fruitière ou en bordure de potager.

PÉTITS FRUITS

Groseilliers à grappes

Ribes rubrum · 8 variétés

Arbustes très rustiques d'1 à 2 m, qui se plaisent au soleil comme à mi-ombre dans un sol frais. Grappes

rouges, blanches ou roses en été, pour la dégustation fraîche, les gelées et les sirops.

Tarifs Racines nues **8 €** · Pot 3 L **12 €**

Par ordre de maturité	Floraison	Juin	Juil	Août	Pollinisation	Page
Umka 🔗	Avril – mai, mellifère				Autofertile	93
Bar-le-Duc blanche 🔗	Printemps				Autofertile	89
Rodava 🔗 ÉPUISÉ	Avril				Autofertile	91
Versillaise rouge 🔗 ÉPUISÉ	Printemps				Autofertile	95
Wilder 🔗 ÉPUISÉ	Printemps, précoce				Autofertile	96
Blanka 🔗	Avril				Autofertile	90
Stanza 🔗	Avril				Autofertile	92
Versillaise Blanche 🔗	Avril – mai				Autofertile	94

 récolte

 consommation

ÉPUISÉ au 24/09/2026

[🔗 fiche sur pomaria.fr](#)

Le tableau classe les variétés par date de récolte ; les fiches qui suivent sont rangées par ordre alphabétique.

Bar-le-Duc blanche

Ribes rubrum

La groseille de la confiture de Bar-le-Duc. Variété ancienne lorraine, à grains blancs, fins et translucides.

Description

Peu de groseilles ont une histoire aussi identifiable. Celle-ci est associée à la confiture de Bar-le-Duc, spécialité lorraine documentée depuis le Moyen Âge, pour laquelle chaque grain était épépiné à la main, à la plume d'oie, sans que la peau soit déchirée. Le résultat — une confiture de grains entiers translucides, parfois qualifiée de « caviar lorrain » — vaut à cette groseille une réputation qui dépasse largement le cercle des jardiniers.

Le buisson est de taille moyenne, au port ramifié. Les grains sont fins, à la peau souple et à la chair translucide, portés en grappes ; c'est précisément cette finesse de peau qui rend l'épépinage possible. La saveur est acidulée et parfumée. Récolte en été.

Culture

Sol frais, humifère, neutre à légèrement acide, drainé en hiver. Soleil ou mi-ombre. Autofertile. Fructification sur le bois de deux et trois ans, taille hivernale de renouvellement en supprimant les branches de plus de trois ans. Paillage au pied — l'enracinement superficiel rend le groseillier sensible au dessèchement estival, surtout pendant le grossissement des fruits. Fruit apprécié des oiseaux.

TARIFS

Pot anti-chignon - 3L

12 €

Disponibilités au 24/09/2026

Floraison	Printemps
Maturité	Été
Exposition	Soleil à mi-ombre
Rusticité	-20°C
Feuillage	Caduc
Strate	Arbuste (1 à 1,50 m)
Pollinisation	Autofertile
Caractéristiques	Grains fins, peau souple

Blanka

Ribes rubrum

Groseillier à grappes blanches légèrement dorées, fruits juteux et parfumés, saveur douce. Variété autofertile, vigoureuse et productive ; récolte en juillet.

Description

Variété de groseillier blanc reconnue pour sa vigueur, sa grande productivité et la qualité de ses fruits. Ses longues grappes de baies translucides, presque nacrées, offrent une chair juteuse, très douce et peu acide, idéale en consommation fraîche ou en transformation (gelées, jus, pâtisseries). Sa mise à fruit est plutôt tardive (mi-juillet).

Culture

Facile à cultiver, ce groseillier forme un arbuste vigoureux et rustique. Il préfère les sols frais et bien drainés, au soleil ou à mi-ombre, et entre rapidement en production. La période de plantation idéale s'étend d'octobre à mars, pour assurer un bon enracinement avant la saison de croissance active.

TARIFS

Pot anti-chignon - 3L **12 €**

Plant en racines nues **épuisé** **8 €**

Disponibilités au 24/09/2026

Floraison	Avril
Maturité	Mi-juillet
Exposition	Soleil à mi-ombre
Rusticité	-25°C
Feuillage	Caduc
Strate	Arbuste (1 à 2 m)
Pollinisation	Autofertile
Caractéristiques	Très productif, fruit doux et peu acide

Rodava

Ribes rubrum

Groseillier à grappes rouge à la saveur agréable et équilibrée. Variété à la fois rustique et très productive. Récolte première quinzaine de juillet.

Description

Variété aux fruits d'un rouge vif, regroupés en longues grappes, qui offrent une saveur équilibrée entre acidité et douceur, idéale pour une consommation en frais ou la transformation. Vigoureux, il forme un arbuste buissonnant au feuillage dense.

Culture

Facile à cultiver, ce groseillier forme un arbuste vigoureux et rustique. Il préfère les sols frais et bien drainés, au soleil ou à mi-ombre, et entre rapidement en production. La période de plantation idéale s'étend d'octobre à mars, pour assurer un bon enracinement avant la saison de croissance active.

TARIFS

ÉPUISÉ

Plant en racines nues **épuisé** **8 €**

Disponibilités au 24/09/2026

Floraison	Avril
Maturité	Début juillet
Exposition	Soleil à mi-ombre
Rusticité	-25°C
Feuillage	Caduc
Strate	Arbuste (1 à 2 m)
Pollinisation	Autofertile
Caractéristiques	Précoce, productif, saveur équilibrée

Stanza

Ribes rubrum

Groseillier à grappes, aux fruits rouges lumineux, très aromatiques. Grappes longues et serrées, excellente qualité gustative. Variété autofertile de mi-saison, récolte en mi-juillet.

Description

Variété de groseillier rouge de mi-saison reconnue pour sa qualité gustative exceptionnelle. Ses longues grappes serrées portent des groseilles rouge lumineux, très aromatiques et faciles à cueillir. La chair juteuse offre une saveur équilibrée, idéale en consommation fraîche ou en transformation (gelées, jus, pâtisseries). Sa mise à fruit intervient mi-juillet.

Culture

Variété autofertile très productive et résistante aux maladies. Ce groseillier forme un arbuste vigoureux au port semi-dressé. Il préfère les sols frais et bien drainés, au soleil ou à mi-ombre. La période de plantation idéale s'étend d'octobre à mars, pour assurer un bon enracinement avant la saison de croissance active.

TARIFS

Pot anti-chignon - 3L **12 €**

Plant en racines nues **épuisé 8 €**

Disponibilités au 24/09/2026

Floraison	Avril
Maturité	Mi-juillet
Exposition	Soleil à mi-ombre
Rusticité	-25°C
Feuillage	Caduc
Strate	Arbuste (1 à 2 m)
Pollinisation	Autofertile
Caractéristiques	Très productif, très aromatique

Umka

Ribes rubrum

Groseille blanche translucide, douce et fraîche, récoltée dès juin. Variété russe d'une rusticité exceptionnelle — jusqu'à -30 °C — et d'une régularité remarquable.

Description

Umka est une sélection russe à fruits blancs, issue des programmes publics de l'ex-URSS, très probablement de l'institut horticole de Michurinsk, dans la seconde moitié du XX^e siècle. Son nom vient d'un ourson polaire de dessin animé — une allusion à la couleur de ses fruits. L'arbuste est buissonnant et arrondi, bien ramifié, de croissance modérée : 1,20 à 1,50 m de haut sur autant de large. Feuillage palmé vert moyen, aromatique au froissement, qui met joliment en valeur l'éclat des grappes claires. La floraison d'avril-mai, en petites fleurs vert-jaunâtre pendantes, est nectarifère et attire les pollinisateurs. La récolte est précoce, dès juin et jusqu'en juillet. Les grappes sont longues et bien fournies, garnies de baies blanches translucides de calibre moyen, à la saveur douce, fraîche et légèrement acidulée — nettement plus accessible que celle des groseilles rouges. Excellentes fraîches, elles se prêtent aussi aux gelées, aux confitures, à la pâtisserie et à la congélation.

Culture

Plutôt mi-ombre ou soleil. Sol profond, humifère, frais mais drainé. Sa rusticité est son atout majeur : elle supporte jusqu'à -30 °C, ce qui la destine aux situations froides et continentales. Autofertile. Taille annuelle en fin d'hiver, en supprimant le bois de plus de trois ans pour renouveler les rameaux fructifères. Paillage conseillé et arrosages suivis pendant la mise à fruits. Culture en bac possible.

TARIFS

Pot anti-chignon - 3L

12 €

Disponibilités au 24/09/2026

Floraison	Avril à mai, mellifère
Maturité	Juin à juillet, précoce
Exposition	Soleil à mi-ombre
Rusticité	-30°C
Feuillage	Caduc
Strate	Arbuste (1,20 à 1,50 m)
Pollinisation	Autofertile
Caractéristiques	Fruits blancs, précoce, très rustique

Versaillaise Blanche

Ribes rubrum

Groseillier à grappes, aux fruits blancs translucides plus ou moins ambrés, pulpe juteuse et fruitée. Grappes courtes à longues, saveur douce et légèrement acidulée. Variété ancienne autofertile très vigoureuse, récolte étalée de mi-juillet à août.

Description

Variété ancienne très appréciée obtenue vers 1835, reconnue pour sa vigueur et sa productivité régulière. Ses grappes portent des baies blanches translucides, parfois légèrement ambrées, à la pulpe juteuse, douce et fruitée avec une légère acidité. Les fruits se consomment parfaitement frais et sont excellents en transformation (gelées à la couleur inattendue, confitures, coulis, sirops). Sa récolte s'étale de mi-juillet à août.

Culture

Variété autofertile très vigoureuse formant un arbuste buissonnant au port érigé. Résistante aux maladies, elle s'adapte à toutes les régions grâce à sa floraison tardive qui évite les gelées printanières. Elle préfère les sols frais et bien drainés, au soleil ou à mi-ombre. La période de plantation idéale s'étend d'octobre à mars.

TARIFS

Pot anti-chignon - 3L **12 €**

Plant en racines nues **8 €**

Disponibilités au 24/09/2026

Floraison	Avril à mai
Maturité	Mi-juillet à août
Exposition	Soleil à mi-ombre
Rusticité	-25°C
Feuillage	Caduc
Strate	Arbuste (1 à 2 m)
Pollinisation	Autofertile
Caractéristiques	Vigoureux, délaissé par les oiseaux

Versaillaise rouge

Ribes rubrum

La grande classique française du XIX^e siècle. Longues grappes de gros fruits rouge vif, à la saveur franchement acidulée — la groseille de référence pour les gelées.

Description

Pendant rouge de la Versaillaise blanche, cette variété ancienne s'est imposée comme l'une des groseilles à grappes les plus cultivées en France. Le buisson est vigoureux et ramifié, d'environ 1,20 à 1,50 m.

Les grappes sont longues, garnies de gros grains rouge vif, translucides et brillants. La saveur est celle qu'on attend d'une groseille rouge : vive, franchement acidulée, avec juste ce qu'il faut de sucre. C'est un profil qui donne toute sa mesure en transformation — gelées, coulis, sirops — plus qu'en consommation fraîche, où les variétés blanches et roses sont plus faciles d'accès. La longueur des grappes facilite nettement la cueillette par rapport aux variétés à grappes courtes. Récolte en juillet.

Culture

Sol frais, riche en matière organique, neutre à légèrement acide, bien drainé en hiver. Soleil ou mi-ombre. Autofertile. Fructification sur le bois de deux et trois ans : tailler en hiver en supprimant les rameaux les plus âgés et en aérant le centre. Enracinement superficiel, donc paillage et arrosage de soutien en cas de sécheresse pendant le grossissement des fruits. Filet anti-oiseaux vivement conseillé à l'approche de la maturité.

TARIFS

ÉPUISÉ

Pot anti-chignon - 3L **épuisé** **12 €**

Disponibilités au 24/09/2026

Floraison	Printemps
Maturité	Juillet
Exposition	Soleil à mi-ombre
Rusticité	-20°C
Feuillage	Caduc
Strate	Arbuste (1 à 1,50 m)
Pollinisation	Autofertile
Caractéristiques	Variété ancienne, longues grappes, acidulée, à gelée

Wilder

Ribes rubrum

Fille américaine de la Versaillaise rouge. Longues grappes de fruits rouge clair, très juteux, parfaits en jus et en gelées. Récolte en juillet.

Description

Wilder a été sélectionnée en 1877 par E. Y. Teas, dans l'Indiana, à partir d'un semis de la Versaillaise rouge — que nous proposons également au catalogue. Elle s'est imposée comme l'une des grandes variétés américaines de son temps : assez robuste pour encaisser les hivers du Midwest, assez régulière pour convaincre les producteurs professionnels. Sa généalogie vaut le détour, puisqu'elle traverse quatre fois l'Atlantique : le groseillier rouge gagne d'abord l'Amérique depuis l'Europe, un Français en tire la Versaillaise rouge en 1835 à partir de la variété américaine Cherry, un Américain en tire Wilder, qui repasse l'océan pour revenir dans nos jardins.

Le buisson est vigoureux et nettement érigé, formant vite une belle charpente équilibrée d'environ 1,20 à 1,50 m. Sa santé générale est excellente, avec une très bonne tenue face aux maladies du feuillage — oïdium et rouille en particulier.

Les grappes sont longues, régulières et bien garnies de grains rouge clair. La saveur est celle qu'on attend d'une groseille rouge, acidulée mais joliment aromatique, avec une texture remarquablement juteuse qui la désigne pour le jus et le vin de groseille, sans exclure les confitures et gelées. La récolte intervient en juillet, et les baies tiennent longtemps sur l'arbuste, ce qui étale naturellement la cueillette sur plusieurs semaines.

Culture

Sol frais, riche en humus, neutre à légèrement acide, bien drainé. Soleil ou mi-ombre. Wilder est autofertile et fructifie seule, mais sa floraison est précoce : associer une autre variété fleurissant à la même période améliore encore la régularité de la production. Fructification sur le bois de deux et trois ans : taille hivernale de renouvellement, en supprimant les rameaux de plus de trois ans. Paillage indispensable, arrosage de soutien en période sèche pendant le grossissement des fruits. Filet anti-oiseaux utile à la maturité.

TARIFS

ÉPUISÉ

Plant en racines nues **épuisé** 8 €

Pot anti-chignon - 3L **épuisé** 12 €

Disponibilités au 24/09/2026

Floraison	Printemps, précoce
Maturité	Juillet
Exposition	Soleil à mi-ombre
Rusticité	-20°C
Feuillage	Caduc
Strate	Arbuste (1,20 à 1,50 m)
Pollinisation	Autofertile
Caractéristiques	Longues grappes, très juteuse, saine

PÉTITS FRUITS

Groseilliers à maquereau

Ribes uva-crispa · 5 variétés

Le groseillier à maquereau est un formidable arbrisseau résistant au froid, au sec, et proposant une fructification fiable et abondante. Autofertile et peu exigeant, il s'épanouit dans les sols frais et bien

drainés, aussi bien au soleil qu'à mi-ombre. Sa robustesse naturelle et sa facilité d'entretien en font un choix privilégié pour les jardins durables et respectueux de l'environnement.

Tarifs Racines nues **8 €** · Pot 3 L **12 €**

Par ordre de maturité	Floraison	Juin	Juil	Août	Pollinisation	Page
Hinnonmaki blanc 🔗 ÉPUISÉ	Avril – mai				Autofertile	100
Captivator 🔗	Printemps				Autofertile	98
Freedonia 🔗	Avril – mai				Autofertile	99
Pixwell 🔗	Avril – mai				Autofertile	101
Spine Free 🔗 ÉPUISÉ	Printemps				Autofertile	102

récolte

consommation

ÉPUISÉ au 24/09/2026

[🔗 fiche sur pomaria.fr](#)

Le tableau classe les variétés par date de récolte ; les fiches qui suivent sont rangées par ordre alphabétique.

Captivator

Ribes uva-crispa

Groseille à maquereau pratiquement sans épines, aux fruits rouges de bonne taille. L'une des trois variétés inermes de référence.

Description

Captivator fait partie du très petit groupe de variétés inermes ou quasi inermes qui ont changé la donne, avec Spine Free et Freedonia. Elles constituent le trio retenu par les producteurs pour permettre une récolte confortable et un échelonnement de juillet à août.

Les fruits sont nettement plus gros que ceux des groseilliers à grappes — plus de 12 mm — à la peau soulignée de stries verticales et à la petite mèche brunâtre à l'extrémité, reste du calice de la fleur. Cueillis à demi mûrs, ils sont acides et se destinent aux sauces et aux compotes ; laissés mûrir, ils deviennent nettement plus sucrés et se mangent frais. Récolte en juillet-août.

Culture

Sol neutre à acide, humifère, riche et frais, avec une préférence pour les terres argileuses ou argilo-calcaires. Plutôt mi-ombre, mais résiste mieux au plein soleil que les groseilliers à grappes. Irrigation nécessaire en juin et juillet pendant le grossissement des fruits. Autofertile. Taille en hiver : supprimer le bois mort et les rameaux dirigés vers le centre.

TARIFS

Pot anti-chignon - 3L

12 €

Disponibilités au 24/09/2026

Floraison	Printemps
Maturité	Juillet à août
Exposition	Mi-ombre
Rusticité	-20°C
Feuillage	Caduc
Strate	Arbuste (1 à 1,50 m)
Pollinisation	Autofertile
Caractéristiques	Pratiquement sans épines, gros fruits

Freedonia

Ribes uva-crispa

Groseillier à maquereau sans épines, aux fruits très gros rouge foncé, pulpe tendre et juteuse. Saveur sucrée à légèrement acidulée, excellente qualité gustative. Variété autofertile résistante aux maladies, récolte tardive en juillet-août.

Description

Variété américaine, reconnue pour ses fruits de très gros calibre et sa résistance au mildiou. Ses baies rond-ovales présentent une peau épaisse rouge foncé et une chair tendre, juteuse, sucrée à légèrement acidulée de très bonne qualité. Sans épines, cette variété facilite grandement la récolte. Les fruits se conservent particulièrement bien et sont excellents frais ou en transformation (confitures, gelées, tartes).

Culture

Variété autofertile très résistante aux maladies, particulièrement au mildiou. Ce groseillier forme un arbuste vigoureux et rustique. Il préfère les sols frais et bien drainés, au soleil ou à mi-ombre. Sa récolte tardive prolonge le plaisir des groseilles en été. La période de plantation idéale s'étend d'octobre à mars.

TARIFS

Pot anti-chignon - 3L **12 €**

Plant en racines nues **8 €**

Disponibilités au 24/09/2026

Floraison	Avril à mai
Maturité	Juillet à août
Exposition	Soleil à mi-ombre
Rusticité	-25°C
Feuillage	Caduc
Strate	Arbuste (1 à 1,5 m)
Pollinisation	Autofertile
Caractéristiques	Sans épines, très gros fruits, récolte tardive

Hinnonmaki blanc



Ribes uva-crispa

Groseillier à maquereau sans épines, aux fruits vert clair très gros, avec une pulpe tendre et juteuse. Saveur sucrée et peu acide, excellente qualité gustative. Variété autofertile résistante aux maladies, récolte tardive en juillet-août.

Description

Variété américaine, reconnue pour ses fruits de très gros calibre. Ses baies rondes-ovales présentent une peau épaisse vert clair et une chair tendre, juteuse, sucrée et légèrement acidulée, de très bonne qualité. Elle a peu d'épine, ce qui facilite grandement la récolte. Les fruits se conservent particulièrement bien et sont excellents frais ou en transformation (confitures, gelées, tartes).

Culture

Variété autofertile très résistante aux maladies, particulièrement au mildiou. Ce groseillier forme un arbuste vigoureux et rustique. Il préfère les sols frais et bien drainés, au soleil ou à mi-ombre. Sa récolte tardive prolonge le plaisir des groseilles en été. La période de plantation idéale s'étend d'octobre à mars.

TARIFS

ÉPUISÉ

Plant en racines nues **épuisé** **8 €**

Disponibilités au 24/09/2026

Floraison	Avril à mai
Maturité	Juin à juillet (précoce)
Exposition	Soleil à mi-ombre
Rusticité	-25°C
Feuillage	Caduc
Strate	Arbuste (1 à 1,5 m)
Pollinisation	Autofertile
Caractéristiques	Épines modérées, très résistant aux maladies, récolte précoce

Pixwell

Ribes uva-crispa

Groseillier à maquereau aux fruits de calibre moyen, vert pâle virant au rose-rouge à maturité, pulpe sucrée et peau légèrement acidulée. Saveur équilibrée et rafraîchissante, excellente qualité gustative. Variété autofertile très productive et robuste, récolte en juillet.

Description

Variété américaine développée dans le Dakota du Nord en 1932, reconnue comme l'une des plus performantes et robustes du genre. Ses baies de taille moyenne (10 à 20 grammes) de couleur vert pâle au début, se parent progressivement de teintes roses à rouges à pleine maturité. La chair sucrée contraste agréablement avec la peau légèrement acidulée, offrant un équilibre gustatif apprécié. Cette variété présente de petites épines sur ses tiges mais reste facile à récolter. Les fruits se dégustent aussi bien verts qu'à maturité et excellent en transformation culinaire.

Culture

Variété autofertile exceptionnellement productive et vigoureuse, remarquablement résistante à l'oïdium. Ce groseillier forme un arbuste buissonnant au port touffu (1m x 1m) aux tiges érigées. Il s'adapte parfaitement aux sols drainés mais frais, en exposition ensoleillée à mi-ombragée. Sa robustesse naturelle et sa forte productivité en font un choix privilégié pour les jardins familiaux. La période de plantation idéale s'étend d'octobre à mars.

TARIFS

Pot anti-chignon - 3L **12 €**

Plant en racines nues **8 €**

Disponibilités au 24/09/2026

Floraison	Avril à mai
Maturité	Juillet
Exposition	Soleil à mi-ombre
Rusticité	-25°C
Feuillage	Caduc
Strate	Arbuste (1 à 1,5 m)
Pollinisation	Autofertile
Caractéristiques	Petites épines, très productif, résistant à l'oïdium

Spine Free

Ribes uva-crispa

Comme son nom l'indique : une groseille à maquereau sans épines. Cueillette sans écorchures, sur un arbuste rustique qui ne demande pas de traitement.

Description

Spine Free appartient, avec Captivator et Freedonia, au trio des groseilliers à maquereau inermes retenus par les producteurs pour rendre la cueillette confortable et étaler la récolte de juillet à août. Son nom dit l'essentiel : l'arbuste est dépourvu des épines qui font la réputation de l'espèce.

Le fruit est solitaire, rond, translucide, nettement plus gros que la groseille à grappes, avec les stries verticales caractéristiques et le petit reste de calice à son extrémité. Cueilli vert, il est acide et sert aux sauces, aux compotes et aux accompagnements de poisson ou de gibier ; laissé mûrir sur l'arbuste, il devient sucré et se déguste frais.

Culture

Sol humifère, riche et frais, neutre à acide, argileux ou argilo-calcaire de préférence. Mi-ombre. Sensibilité à la sécheresse qui nécessite un arrosage sur les périodes critiques en juin-juillet. Autofertile. Taille hivernale : bois mort, rameaux tournés vers l'intérieur. Variété rustique et résistante à l'oïdium.

TARIFS

ÉPUISÉ

Pot anti-chignon - 3L **épuisé** **12 €**

Disponibilités au 24/09/2026

Floraison	Printemps
Maturité	Juillet à août
Exposition	Mi-ombre
Rusticité	-20°C
Feuillage	Caduc
Strate	Arbuste (1 à 1,50 m)
Pollinisation	Autofertile
Caractéristiques	Sans épines, rustique

PETITS FRUITS

Cassissiers

Ribes nigrum · 4 variétés

Le cassisier est un arbuste généreux et rustique qui produit de belles grappes de baies noires riches en arômes et excellentes en transformation (jus, sirops, confitures). Autofertile, il donne cependant de

meilleurs résultats lorsqu'il est accompagné d'une autre variété à floraison proche, pour favoriser une pollinisation croisée.

Tarifs Racines nues **8 €** · Pot 3 L **12 €**

Par ordre de maturité	Floraison	Juin	Juil	Août	Pollinisation	Page
Arno 🔗	Précoce				Autofertile	105
Géant de Boskoop 🔗	Avril – mai				Autofertile	107
Andega 🔗	Avril – mai				Autofertile	104
Blackdown 🔗	Avril (précoce)				Autofertile	106

récolte

consommation

ÉPUISÉ au 24/09/2026

[🔗](#) fiche sur pomaria.fr

Le tableau classe les variétés par date de récolte ; les fiches qui suivent sont rangées par ordre alphabétique.

Andega

Ribes nigrum

Gros cassis noirs légèrement rosés, charnus, acidulés et aromatiques. Variété autofertile très productive et résistante à l'oïdium. Récolte mi-juillet.

Description

Variété française obtenue en 1987, le cassissier Andega forme un arbuste buissonnant de vigueur moyenne au port érigé. Il atteint à maturité environ 1,5 mètre de hauteur sur 1 mètre de largeur. Son écorce caractéristique est de couleur jaune. Ce cassissier produit de gros fruits noirs légèrement rosés, charnus et particulièrement goûteux. Leur chair ferme est acidulée et aromatique, et contient peu de pépins. Maturité mi-juillet. Baies à déguster fraîches ou transformées.

Culture

Variété très productive et facile à cultiver. Elle est résistante à l'oïdium et tolérante aux maladies courantes. Le cassissier préfère les sols profonds, et humifères à pH neutre ou légèrement acide, mais s'adapte aussi aux sols calcaires. Une exposition mi-ombre est recommandée. La plantation s'effectue idéalement d'octobre à mars. Andega est autofertile mais une pollinisation croisée permettra une meilleur fructification.

TARIFS

Plant en racines nues **8 €**

Pot anti-chignon - 3L **12 €**

Disponibilités au 24/09/2026

Floraison	Avril à mai
Maturité	Mi-juillet
Exposition	Soleil à mi-ombre
Rusticité	-25°C
Feuillage	Caduc
Strate	Arbuste (1 à 1,5 m)
Pollinisation	Autofertile, pollinisation croisée avec Blackdown
Caractéristiques	Résistant à l'oïdium, gros fruits, très productif

Arno

Ribes nigrum

Variété précoce à très faibles besoins en froid, donc également adaptée aux climats doux et littoraux où les autres cassissiers fleurissent mal. Longues grappes de gros fruits fermes et sucrés, dès la mi-juin.

Description

Arno est une sélection de la pépinière Ribanjou, obtenue dans les années 2000 par croisement entre 'Bigrou' et 'Troll'. Contrairement aux autres variétés de cassissier, elle se contente de très peu de froid hivernal pour déclencher sa floraison. Le buisson est vigoureux, au port érigé, d'environ 1,50 m de haut sur 1 m de large. Peu drageonnant ; il se montre résistant à l'oïdium.

Les grappes sont longues et généreuses, garnies de gros fruits fermes. La saveur est plus douce que celle des cassis traditionnels, sucrée et joliment acidulée : agréable en consommation fraîche. Elle se prête bien sûr aussi aux gelées, sirops et liqueurs. La récolte débute mi-juin à fin juin, soit une semaine à dix jours avant Géant de Boskoop. Feuilles et bourgeons, très aromatiques, s'utilisent en infusion.

Culture

Le cassissier s'accommode de la plupart des sols jusqu'à un pH de 7,5, à condition qu'ils restent frais, riches en humus et bien drainés en hiver ; il n'apprécie pas le calcaire franc. Soleil pour une production maximale, mi-ombre légère aux heures les plus chaudes en région méridionale. Sensible à la sécheresse estivale comme tous les cassissiers : arrosage à surveiller en juin-juillet. Autofertile. Taille en hiver : supprimer le bois de plus de trois ans pour renouveler la charpente.

TARIFS

Plant en racines nues **8 €**

Pot anti-chignon - 3L **12 €**

Disponibilités au 24/09/2026

Floraison	Précoce
Maturité	Mi-juin à fin juin
Exposition	Soleil à mi-ombre
Rusticité	-18°C
Feuillage	Caduc
Strate	Arbuste (1,50 m)
Pollinisation	Autofertile
Caractéristiques	Précoce, faibles besoins en froid, résistant à l'oïdium

Blackdown

Ribes nigrum

Cassis noirs violacés de calibre moyen, fermes et juteux, à saveur douce et parfumée. Variété autofertile anglaise très productive et résistante à l'oïdium. Récolte en juillet.

Description

Variété anglaise obtenue en 1974, Blackdown forme un arbuste buissonnant de vigueur moyenne au port semi-érigé. Il atteint environ 1,5 mètre de hauteur sur 1 mètre de largeur. Sa floraison précoce, dès avril, peut le rendre sensible aux gelées printanières. Variété tardive, produisant des grappes multiples, courtes mais bien fournies, de couleur noir violacé, aux fruits fermes et bien parfumés. Sa saveur est relativement douce et sucrée. Les fruits, riches en vitamine C, se dégustent frais ou en transformation.

Culture

Variété de culture facile, peu sensible à l'oïdium et supporte les sols calcaires. Il offre un bon rendement et une production très régulière. Préfère les sols frais et bien drainés, en exposition idéale à mi-ombre. La plantation s'effectue idéalement d'octobre à mars. Blackdown est autofertile mais une pollinisation croisée permettra une meilleure fructification.

TARIFS

Pot anti-chignon - 3L **12 €**

Plant en racines nues **épuisé** **8 €**

Disponibilités au 24/09/2026

Floraison	Avril (précoce)
Maturité	Mi-juillet à fin juillet
Exposition	Soleil à mi-ombre
Rusticité	-25°C
Feuillage	Caduc
Strate	Arbuste (1 à 1,5 m)
Pollinisation	Autofertile, pollinisation croisée avec Andega
Caractéristiques	Résistant à l'oïdium, très productif

Géant de Boskoop



Ribes nigrum

Cassissier à gros fruit noir brillant à la peau très fine, très parfumé. Variété vigoureuse et rustique, résistante à l'oïdium. Maturité précoce.

Description

Variété ancienne hollandaise obtenue en 1887, reconnue pour ses très longues grappes desserrées et ses gros fruits noirs brillants à la peau très fine. La pulpe juteuse offre une saveur acidulée et aromatique, particulièrement parfumée à maturité complète. Les fruits se consomment frais ou sont excellents en transformation (confitures, gelées, sirops, liqueurs). Cette variété précoce ouvre la saison des cassis dès début juillet.

Culture

Variété vigoureuse et rustique, résistante à l'oïdium. Excellent pollinisateur pour les autres variétés de cassissier. Cet arbuste compact forme un buisson de 1,5 m de haut sur 1 m de large. Il préfère les sols profonds, humifères et frais, au soleil non brûlant ou à mi-ombre, à l'abri des gelées printanières. La période de plantation idéale s'étend d'octobre à mars. Cette variété est autofertile mais une pollinisation croisée permettra une meilleure fructification.

TARIFS

Pot anti-chignon - 3L **12 €**

Plant en racines nues **épuisé** **8 €**

Disponibilités au 24/09/2026

Floraison	Avril à mai
Maturité	Début juillet
Exposition	Soleil à mi-ombre
Rusticité	-25°C
Feuillage	Caduc
Strate	Arbuste (1 à 1,5 m)
Pollinisation	Autofertile, pollinisation croisée avec Andega
Caractéristiques	Variété ancienne, précoce, longues grappes, résistant à l'oïdium

PÉTITS FRUITS

Casseilliers

Ribes × nidigrolaria · 2 variétés

Le casseillier est un arbuste fruitier hybride issu du croisement naturel entre cassissier et groseillier à maquereau. Il hérite des qualités des deux espèces : une excellente rusticité (jusqu'à -25 °C), une bonne résistance aux maladies, pas d'épines, et une


production régulière de grosses baies noires, douces, peu acides et très parfumées. Il s'adapte facilement aux sols frais, profonds et bien drainés, au soleil ou à mi-ombre, et ne nécessite que peu d'entretien.

Tarifs Racines nues **12 €** · Pot 3 L **12 €**

Par ordre de maturité	Floraison	Juil	Août	Sept	Pollinisation	Page
-----------------------	-----------	------	------	------	---------------	------

Anita [🔗](#)

Avril – mai




Autofertile

109

Josta [🔗](#)

Mai



Autofertile

110

récolte

consommation

ÉPUISÉ au 24/09/2026

[🔗](#) fiche sur pomaria.fr

Le tableau classe les variétés par date de récolte ; les fiches qui suivent sont rangées par ordre alphabétique.

Anita

Ribes × nidigrolaria

Arbuste sans épines, aux gros fruits noirs sphériques, pulpe juteuse et acidulée. Saveur moins prononcée que le cassis, bien parfumée à maturité. Variété hybride autofertile très précoce, vigoureuse et productive, récolte en juillet.

Description

Variété hybride issue du croisement entre cassissier et groseillier à maquereau, reconnue pour sa vigueur exceptionnelle et sa précocité. Ses gros fruits noirs sphériques offrent une saveur acidulée et parfumée, moins prononcée que le cassis, permettant une consommation fraîche agréable. Les fruits se récoltent facilement grâce à l'absence d'épines et sont excellents frais ou en transformation (gelées, confitures, sirops). La récolte s'étale sur environ 2 semaines en juillet.

Culture

Variété autofertile très vigoureuse et productive dès la deuxième année. Cet arbuste sans épines forme un buisson de 1,5 à 2 mètres de haut pour une envergure équivalente. Très rustique et résistant aux maladies, il s'adapte facilement à différents sols et expositions. Il préfère les sols frais et bien drainés, au soleil ou à mi-ombre. La période de plantation idéale s'étend d'octobre à avril.

TARIFS

Plant en racines nues **12 €**

Pot anti-chignon - 3L **12 €**

Disponibilités au 24/09/2026

Floraison	Avril à mai
Maturité	Début juillet
Exposition	Soleil à mi-ombre
Rusticité	-25°C
Feuillage	Caduc
Strate	Arbuste (1,5 m)
Pollinisation	Autofertile
Caractéristiques	Sans épines, très vigoureux, gros fruits

Josta

Ribes × nidigrolaria

Casseillier sans épines, aux grosses baies noires ressemblant à de gros cassis, texture proche des groseilles. Saveur sucrée et légèrement acidulée, parfum plus léger que le cassis. Variété hybride autofertile très rustique et productive, récolte en juillet.

Description

Variété hybride issue du croisement entre groseillier à maquereau et cassissier, reconnue pour sa vigueur et sa facilité de culture. Ses grosses baies noires à maturité offrent une saveur sucrée et acidulée avec des nuances de cassis et de groseille, plus douce et moins acide que le cassis. Les fruits se récoltent facilement grâce à l'absence d'épines et sont excellents frais ou en transformation (confitures, sorbets, tartes, sirops). La récolte s'effectue en juillet.

Culture

Variété autofertile très rustique et résistante aux maladies, particulièrement vigoureuse et productive. Cet arbuste sans épines forme un buisson touffu de 1,5 à 2 mètres de haut. Il s'adapte facilement à différents types de sols, préférant les sols profonds, humifères et frais. Il accepte le soleil comme la mi-ombre. La période de plantation idéale s'étend d'octobre à mars.

TARIFS

Pot anti-chignon - 3L **12 €**

Plant en racines nues **12 €**

Disponibilités au 24/09/2026

Floraison	Mai
Maturité	Début juillet
Exposition	Soleil à mi-ombre
Rusticité	-25°C
Feuillage	Caduc
Strate	Arbuste (1,5 m)
Pollinisation	Autofertile
Caractéristiques	Sans épines, productif, saveur douce

PÉTITS FRUITS

Vignes

5 variétés

Nous sélectionnons actuellement des cépages rustiques, savoureux et très résistants : adaptés à une

culture en plein air sans traitements, dans un esprit de jardin nourricier et résilient.

Tarifs Pot 3 L **15 €**

Par ordre de maturité	Floraison	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Pollinisation	Page
Galanth 🔗	Printemps						Autofertile	113
Perdin 🔗	Mai – juin						Autofertile	116
Goldlife Muscat 🔗	Printemps						Autofertile	114
Isabelle 🔗	Printemps						Autofertile	115
Angela 🔗	Juin						Autofertile	112

 récolte

 consommation

ÉPUISÉ au 24/09/2026

[🔗 fiche sur pomaria.fr](#)

Le tableau classe les variétés par date de récolte ; les fiches qui suivent sont rangées par ordre alphabétique.



Angela

Vitis interspécifique

Raisin blanc hongrois à grosses grappes de 400 g, résistant au mildiou et à l'oïdium. Sa conservation exceptionnelle, sur pied comme après récolte, prolonge la saison des raisins bien après les autres.

Description

Angela est une variété hongroise de raisin de table blanc, encore peu répandue en France. Elle appartient au groupe des vignes résistantes, sélectionnées pour se passer de l'essentiel des traitements fongicides : sa tolérance au mildiou et à l'oïdium est forte, là où un cépage traditionnel réclame huit à dix passages dans la saison.

Les grappes sont grandes, généreuses, pesant couramment 400 g. Les grains sont ovales, de calibre moyen à gros, passant du vert-jaune au jaune doré à pleine maturité. La chair est ferme et juteuse, la saveur franchement sucrée et joliment aromatique.

Angela se conserve remarquablement, aussi bien sur le pied qu'une fois cueillie. Les grappes tiennent des semaines sans se flétrir, ce qui permet d'échelonner la consommation longtemps après la récolte — un caractère rare chez le raisin de table, qui lui vaut d'être comparée au vieux cépage Servant.

Culture

Exposition ensoleillée, sol drainé. Conduite en treille, pergola, palissage contre un mur ou en rangée. Taille hivernale classique. Sa maturité est tardive : c'est ce qui fait sa force en climat chaud et sa limite ailleurs. Sous un climat frais ou en altitude, une exposition très ensoleillée et abritée est indispensable pour que les grappes arrivent à maturité ; mieux vaut alors l'associer à une ou deux variétés plus précoces plutôt que de lui confier toute la récolte.

TARIFS

Pot anti-chignon - 3L

15 €

Disponibilités au 24/09/2026

Floraison	Juin
Maturité	Octobre à novembre
Exposition	Soleil
Rusticité	-20°C
Feuillage	Caduc
Strate	Liane (treille, pergola)
Pollinisation	Autofertile
Caractéristiques	Grosses grappes, résistante aux maladies, longue conservation



Galanth

Vitis interspécifique

Raisin de table bleu foncé au goût de muscat marqué et à très peu de pépins. Résistance aux maladies fongiques exceptionnelle : culture sans traitement possible.

Description

Galanth est une variété interspécifique obtenue en 1991 à Freiburg, en Allemagne, par croisement entre Muscat Bleu et Solaris. Encore peu répandue en France, elle est bien installée chez nos voisins allemands et belges. Son intérêt principal est sanitaire : la résistance aux maladies fongiques est très élevée, ce qui autorise une conduite entièrement sans traitement — un argument décisif pour un jardin familial. Elle s'adapte par ailleurs à une large gamme de terrains.

Les grappes sont de taille moyenne, plutôt allongées, souvent accompagnées de petits grappillons. Les grains sont bleu foncé, à la saveur nettement muscatée et avec très peu de pépins — deux caractères qui en font un raisin apprécié des enfants.

Culture

Exposition ensoleillée, sol drainé, sans exigence particulière. Idéalement à l'abri du vent, qui peut abîmer son feuillage et ses grappes. Conduite classique sur treille, pergola ou palissage, taille en hiver.

TARIFS

Pot anti-chignon - 3L

15 €

Disponibilités au 24/09/2026

Floraison	Printemps
Maturité	Fin d'été à automne
Exposition	Soleil, à l'abri du vent
Rusticité	-20°C
Feuillage	Caduc
Strate	Liane (treille, pergola)
Pollinisation	Autofertile
Caractéristiques	Goût muscat, très peu de pépins, très résistante aux maladies

Goldlife Muscat

Vitis interspécifique

Muscat blanc à gros grains, en grappes généreuses de 400 à 500 g. Variété résistante aux maladies, récoltée en septembre. Table, jus ou vin.

Description

Goldlife Muscat, aussi connue sous le nom hongrois de Poloskei Muskotaly, appartient au groupe des variétés résistantes — ces vignes sélectionnées pour se passer de l'essentiel des traitements fongicides.

Les grappes sont grosses, de 400 à 500 g, de forme pyramidale à cylindrique, ailées et suffisamment aérées pour bien sécher après la pluie. Les grains sont blancs, gros et ronds, à pépins, d'un arôme muscaté franc et persistant en bouche. Maturité en septembre. Elle se prête aussi bien à la consommation fraîche qu'au jus ou au vin.

Culture

Exposition ensoleillée, sol drainé. Conduite en treille, pergola, palissage contre un mur ou même en grand bac. Sa résistance est élevée au mildiou et à la pourriture grise ; elle est plus modérée à l'oïdium sur grappes, ce qui justifie un ou deux passages au soufre autour de la floraison en année humide — à comparer aux huit à dix traitements d'un cépage traditionnel. Taille hivernale classique.

TARIFS

Pot anti-chignon - 3L

15 €

Disponibilités au 24/09/2026

Floraison	Printemps
Maturité	Septembre
Exposition	Soleil
Rusticité	-20°C
Feuillage	Caduc
Strate	Liane (treille, pergola)
Pollinisation	Autofertile
Caractéristiques	Muscat blanc, grosses grappes, résistante aux maladies

Isabelle

Vitis labrusca × *vinifera*

Le fameux « raisin fraise », au goût foxé inimitable. Variété américaine d'une robustesse remarquable, idéale en treille.

Description

Isabelle est un croisement entre *Vitis labrusca*, espèce américaine, et *Vitis vinifera*. Elle doit sa notoriété à son arôme : ce goût dit « foxé », très caractéristique, qui évoque la fraise et lui vaut son surnom populaire de raisin fraise. On l'aime ou on ne l'aime pas, mais on ne l'oublie pas.

Variété très robuste, comme les autres hybrides producteurs directs, issus de l'après-phyllloxéra. Elle résiste remarquablement bien aux maladies cryptogamiques et au froid, ce qui en fait une vigne de treille ultra-résistante. Les grains noirs à la peau épaisse se détachent facilement de la pulpe. Consommation en raisin de table et idéal pour la production de jus.

Culture

Sol ordinaire, exposition ensoleillée, conduite en treille, pergola ou palissage. Rusticité élevée, résistance aux maladies excellente : c'est une vigne qui se passe de traitements dans la plupart des situations. Taille hivernale classique. Sa vigueur est forte, elle couvre vite une structure — un atout pour ombrager une terrasse ou une tonnelle.

TARIFS

Pot anti-chignon - 3L

15 €

Disponibilités au 24/09/2026

Floraison	Printemps
Maturité	Fin septembre à octobre
Exposition	Soleil
Rusticité	-25°C
Feuillage	Caduc
Strate	Liane vigoureuse (treille, tonnelle)
Pollinisation	Autofertile
Caractéristiques	Goût de fraise, très rustique, très résistante aux maladies

Perdin

Vitis vinifera

Raisin de table doré à petits grains juteux et aromatiques au goût musqué. Variété résistante aux maladies, très précoce et productive. Récolte précoce dès fin juillet-août.

— L'arbre

Vigne Perdin est croisement interspécifique obtenu en 1981 par l'INRA. Cultivar qui s'adapte très bien à tous les climats et peut être cultivée dans toute la France sans problème. Feuillage vigoureux et décoratif, prenant de belles couleurs automnales. Productivité est élevée

— Le fruit

Ses grappes de raisins d'environ 200g donnent des grains jaunes dorés à maturité. Les baies sont belles, dorées, à la chair juteuse, aromatiques et savoureuses. Très précoce, la récolte s'effectue dès fin juillet ou début août selon les régions. Les raisins se dégustent frais, se conservent bien et conviennent parfaitement pour les jus, gelées et confitures maison.

— Culture

Très bonne résistance aux maladies (dont notamment les principales : Oïdium, botrytis et Mildiou). Exposition chaude et abritée recommandée. Son débourrement est précoce, généralement mi mars, ce qui la rend sensible aux gelées printanières. La plantation s'effectue idéalement d'octobre à mars.

TARIFS

Pot anti-chignon - 3L

15 €

Disponibilités au 24/09/2026

Floraison	Mai à juin
Maturité	Fin juillet à août
Exposition	Soleil
Rusticité	-15°C
Feuillage	Caduc
Strate	Liane (treille, pergola)
Pollinisation	Autofertile
Caractéristiques	Résistante aux maladies, très précoce, tous climats

PÉTITS FRUITS

Ronce frutièrè (sans épine)

Rubus fruticosus · 1 variétés

Les ronces frutières sans épines sont des plantes faciles à cultiver, qui offrent de savoureuses mûres agréables à récolter. Nous avons sélectionné une


variété vigoureuse et productive de notre Jardin des Pieds-mères.

Tarifs Pot 3 L **12 €**

Par ordre de maturité	Floraison	Août	Sept	Oct	Pollinisation	Page
-----------------------	-----------	------	------	-----	---------------	------

Lochness [🔗](#)

Mai – juin



Autofertile

118

récolte

consommation

ÉPUISÉ au 24/09/2026

[🔗](#) fiche sur pomaria.fr

Le tableau classe les variétés par date de récolte ; les fiches qui suivent sont rangées par ordre alphabétique.

Lochness

Rubus fruticosus

Mûres de gros calibre noires et juteuses, sans épines. Variété vigoureuse et productive d'origine anglaise, plus résistante au froid que les variétés américaines. Récolte abondante en août.

Description

Variété sans épines d'origine anglaise, présentant des branches souples de 1 à 2 mètres de hauteur. Une des rares souches européennes plus résistantes au froid que les variétés américaines. Produit de gros fruits noirs et ovales, juteux et sucrés à maturité. Production échelonnée, dès mi-août avec rendement élevé.

Culture

Variété autofertile de culture facile, vigoureuse et productive. S'adapte à différents types de sols mais préfère les terres neutres et bien drainées. Une exposition ensoleillée est recommandée ; les besoins en eau sont modérés. Plantation en automne ou au printemps avec arrosage copieux le premier été.

TARIFS

Pot anti-chignon - 3L

12 €

Disponibilités au 24/09/2026

Floraison	Mai à juin
Maturité	Mi-août
Exposition	Soleil
Rusticité	-15°C
Feuillage	Caduc
Strate	Arbuste (1 à 2 m)
Pollinisation	Autofertile
Caractéristiques	Sans épines, très productive, gros fruits

PÉTITS FRUITS

Gojis

Lycium barbarum · 3 variétés

Le goji (Lycium barbarum) est un arbuste originaire d'Asie, apprécié pour ses petites baies rouges aux vertus nutritionnelles reconnues. Il est rustique, facile à

cultiver et très productif une fois bien installé. Il s'adapte à une large gamme de sols, et apprécie une exposition ensoleillée.

Tarifs Racines nues **8 €** · Pot 3 L **12 €**

Par ordre de maturité	Floraison	Juil	Août	Sept	Oct	Pollinisation	Page
Amber Sweet 🔗	Juin – juillet					Autofertile	120
New Big 🔗	Mai – juin					Autofertile	121
Princess Tao 🔗 ÉPUISÉ	Juin – août					Autofertile	122

 récolte

 consommation

ÉPUISÉ au 24/09/2026

[🔗](#) fiche sur pomaria.fr

Le tableau classe les variétés par date de récolte ; les fiches qui suivent sont rangées par ordre alphabétique.

Amber Sweet

Lycium barbarum

Variété de goji à fruits jaune ambré. Productive, buissonnante, et parfaitement à l'aise en sol pauvre et sec.

Description

Le lyciet commun, ou goji, est un arbuste de la famille des Solanacées — cousin de la tomate et du poivron — originaire d'Asie de l'Est, où son fruit est utilisé depuis des siècles. Amber Sweet se caractérise par ses fruits jaune ambré. La variété est productive.

L'arbuste est buissonnant, d'environ 1,50 m en tous sens, au port souvent un peu retombant et parfois épineux. Les fleurs, violettes à roses, s'ouvrent en juin-juillet, solitaires ou par petits bouquets à l'aisselle des feuilles ; les fruits suivent quatre à six semaines plus tard. Ils se consomment frais ou séchés. Seule la baie se consomme, le reste de la plante n'est pas comestible.

Culture

C'est une plante de terrain difficile, et c'est là son intérêt. Elle demande un sol drainé et léger, tolère parfaitement les sols pauvres et calcaires, et supporte la sécheresse une fois installée. Plein soleil. Rusticité autour de -15 °C. Autofertile. La taille annuelle est utile : sans intervention, le lyciet s'étale et se dégarnit ; rabattu chaque hiver, il reste compact et fructifie mieux.

TARIFS

Pot anti-chignon - 3L

12 €

Disponibilités au 24/09/2026

Floraison	Juin à juillet
Maturité	Fin d'été à automne
Exposition	Soleil
Rusticité	-15°C
Feuillage	Caduc
Strate	Arbuste (1,50 m)
Pollinisation	Autofertile
Caractéristiques	Fruits jaune ambré, productive

New Big

Lycium barbarum

Baies de goji de gros calibre rouge-orangé. Variété productive et rustique aux propriétés nutritionnelles exceptionnelles. Récolte de juillet à octobre.

Description

New Big est une variété de goji d'obtention récente à gros fruits rouges, et productive. Arbuste au port buissonnant et retombant atteignant 2 mètres de hauteur à maturité. Les fleurs rouges arrivent au mois de mai. Il produit de gros fruits rouge-orangé avec une teneur spectaculaire en vitamine C. Le fruit est une petite baie rouge miraculeuse classée parmi les super-aliments, riche en vitamines, calcium, protéines, fer, bêta-carotène. Les fruits sont consommés une fois bien mûrs (fruit mou) ou après séchage.

Culture

Cette plante extraordinaire pousse à peu près partout avec une légère préférence pour les sols alcalins. Très rustique (-20°) et résistant à l'oïdium, il produit dès la première année. Exposition soleil à mi-ombre, mais privilégiez une zone fraîche ou semi-ombragée. La plantation se fait idéalement d'octobre à mars. Le goji résiste bien à la sécheresse une fois établi.

TARIFS

Pot anti-chignon - 3L **12 €**

Plant en racines nues **8 €**

Disponibilités au 24/09/2026

Floraison	Mai à juin
Maturité	Juillet à début octobre
Exposition	Soleil à mi-ombre
Rusticité	-20°C
Feuillage	Caduc
Strate	Arbuste (2 m)
Pollinisation	Autofertile
Caractéristiques	Gros fruits

Princess Tao

Lycium barbarum

Baies de goji orange plus sucrées que l'espèce type, riches en antioxydants et vitamines. Sélection française adaptée au climat français et résistante à l'oïdium. Arbuste au port érigé idéal pour jardins et massifs. Récolte d'août à octobre.

Description

Sélection française aux branches arquées, ramifiées et retombantes, atteignant 1,5 à 3 mètres de hauteur. Floraison de juin à août avec de petites fleurs violettes qui se transforment en multitude de baies orange en septembre. Les fruits sont plus sucrés que chez les autres variétés tout en conservant les valeurs nutritives exceptionnelles de la fameuse baie de goji. Production abondante, à récolter quand elles sont bien rouges.

Culture

Variété très facile de culture, qui s'adapte à différents types de sols (avec une préférence pour les sols calcaires). Privilégier une exposition soleil à mi-ombre. Excellente résistance à l'oïdium, maladie courante chez les gojis. La plantation s'effectue idéalement entre octobre et mars. Arbuste résistant à la sécheresse une fois établi.

TARIFS

ÉPUISÉ

Pot anti-chignon - 3L **épuisé** **12 €**

Disponibilités au 24/09/2026

Floraison	Juin à août
Maturité	Août à début octobre
Exposition	Soleil à mi-ombre
Rusticité	-20°C
Feuillage	Caduc
Strate	Arbuste (1,5 à 3 m)
Pollinisation	Autofertile
Caractéristiques	Fruits bien sucrés, résistant oïdium

04

Plantes compagnes

Plantes compagnes

3

Un verger ne se résume pas à ses arbres fruitiers. Autour d'eux, d'autres plantes travaillent : elles nourrissent le sol, fournissent la matière première du paillage et des liens, retiennent les berges, attirent les pollinisateurs, et se retrouvent parfois dans l'assiette.

PLANTES COMPAGNES

Plantes compagnes

3 variétés

Un verger ne se résume pas à ses arbres fruitiers. Autour d'eux, d'autres plantes travaillent : elles nourrissent le sol, fournissent la matière première du

paillage et des liens, retiennent les berges, attirent les pollinisateurs, et se retrouvent parfois dans l'assiette.

Tarifs Racines nues **15 €** · Pot 1 L **5 €** · Pot 3 L **30 €**

Variété	Floraison	Usage ou particularité	Page
Arbre à salade - Flamingo (Toona sinensis) 🔗	Juin – juillet, blanc crème parfumée	Pousses roses ornementales, feuillage comestible	125
Consoude - Bocking 14 🔗	Printemps – été, violette, mellifère	Stérile, très riche en potasse	126
Osier jaune 🔗	Avril – mai, chatons mellifères	Rameaux jaune vif, usages multiples	127

[🔗](#) fiche sur pomaria.fr

Les fiches qui suivent sont rangées par ordre alphabétique.

Arbre à salade - Flamingo (Toona sinensis)

Toona sinensis

Jeunes pousses rose flamant au printemps, comestibles et parfumées d'oignon. Un légume-feuille chinois millénaire sur un arbre ornemental à croissance rapide.

La plante

Le cédrèle de Chine, qu'on appelle parfois l'arbre à salade (*Toona sinensis*), appartient aux Méliacées en étant la seule espèce de son genre à supporter les climats tempérés. En Chine, où on le cultive depuis plus de deux mille ans sous le nom de xiāng chūn, ce n'est pas un arbre d'ornement mais un légume.

'Flamingo' en est le cultivar ornemental, le seul du genre à être multiplié végétativement. Son feuillage se compose de grandes feuilles pennées, longues jusqu'à 40 cm, qui débourent d'un rose vif spectaculaire, passent au crème, puis au vert tendre. Le port est étroit, fastigié à colonnaire, la croissance rapide, la hauteur adulte de 6 à 10 m sous nos latitudes. En été s'ouvrent de petites fleurs blanc crème parfumées, et l'écorce crevassée dégage une odeur de cèdre. Il peut également être conduit en trogne car il supporte bien la taille.

Usages

Les jeunes pousses printanières sont la partie consommée, et leur saveur est unique : un mélange aromatique complexe d'oignon, d'ail et de céleri. La fenêtre de récolte est courte — une quinzaine de jours après leur apparition. Passé ce stade, elles deviennent trop fibreuses.

Crues et en petite quantité, elles relèvent une salade ou un pesto. Cuites, elles donnent leur pleine mesure : ciselées dans une omelette — le plat classique en Chine —, sautées avec du riz ou des nouilles, ou pour parfumer un bouillon. Le goût est puissant : comptez une petite poignée pour quatre, et blanchissez-les si vous voulez en atténuer l'intensité. Comme la saison est brève, la tradition veut qu'on les sèche en poudre ou qu'on les transforme en pâte, consommables toute l'année. Une précaution à connaître : les pousses contiennent des composés soufrés volatils qui peuvent irriter si on les consomme crues en grande quantité ; la cuisson les réduit, et l'usage traditionnel est modéré.

Culture

Tolérant sur la nature du sol, y compris calcaire et argileux, à condition qu'il soit drainé. Exposition ensoleillée à mi-ombragée. Arrosage régulier les premières années, puis modéré une fois établi, avec un paillage épais en été. Entretien minimal, l'arbre étant peu sensible aux maladies et aux ravageurs. Pour la production de pousses, la taille change tout : un recépage sévère ou une conduite en cépée multiplie les jeunes repousses accessibles depuis le sol — c'est ainsi qu'on le cultive en Asie. Comptez trois à quatre ans avant une première récolte significative, cinq à six pour une production intéressante.

TARIFS

ÉPUISÉ

Pot anti-chignon - 3L **épuisé** **30 €**

Disponibilités au 24/09/2026

Floraison	Juin à juillet, blanc crème parfumée
Récolte	Jeunes pousses, une quinzaine de jours au débourrement
Exposition	Soleil à mi-ombre
Rusticité	-15°C
Feuillage	Caduc
Strate	Arbre (6 à 10 m, ou cépée)
Multiplication	Multiplication végétative
Caractéristiques	Pousses roses ornementales, feuillage comestible

Consoude - Bocking 14

Symphytum × uplandicum

La consoude des jardiniers : stérile, donc jamais envahissante, et la plus riche en potasse. Une plante extraordinaire et essentielle pour les jardiniers avec une approche sol-vivant ou des amoureux des jardins-forêts. Nous l'utilisons beaucoup au verger. Trois à quatre coupes par an pour le purin, le paillage et le compost.

La plante

La consoude de Russie est un hybride naturel entre la consoude officinale et la consoude rugueuse, décrit pour la première fois en Suède en 1854. Le cultivar Bocking 14 est né dans les années 1950 du travail de Lawrence D. Hills, agronome britannique et fondateur de la Henry Doubleday Research Association. Passionné par les qualités de la consoude mais gêné par son caractère envahissant, il a testé une vingtaine de sélections dans sa station de Bocking, dans l'Essex, et retenu celle-ci pour deux raisons : son rendement en biomasse et sa teneur en potasse, les plus élevés du lot.

C'est une vivace herbacée robuste, au grand feuillage caduc épais et à la floraison violette, mellifère. Son atout décisif est d'être stérile : elle fleurit mais ne monte pas en graines, et ne se ressème donc jamais — contrairement aux consoudes sauvages, qui peuvent coloniser rapidement un jardin. Sa racine pivotante puissante descend chercher dans le sous-sol des minéraux hors de portée des cultures annuelles, et les restitue dans ses feuilles.

Usages

À l'analyse, les feuilles fanées de Bocking 14 titrent 0,74 % d'azote, 0,24 % de phosphore et 1,19 % de potasse, pour un rapport C/N de 9,8 — là où un fumier ordinaire plafonne à 0,32 % de potasse pour un C/N de 14. C'est près de quatre fois plus de potasse, et une décomposition bien plus rapide.

En pratique : purin, en laissant macérer les feuilles dans l'eau deux à trois semaines, pour un engrais liquide riche en potassium particulièrement adapté aux tomates, aux pommes de terre et aux fruitiers en cours de fructification. Paillage, en étalant la fauche au pied des cultures ou des arbres. Activateur de compost, quelques poignées suffisant à relancer un tas qui traîne. Fond de trou de plantation, une ou deux feuilles déposées avant de mettre le plant en place. Fourrage pour les volailles et les lapins. Et couvre-sol : rien ne pousse sous une consoude installée.

Culture

Soleil ou mi-ombre, sol profond, riche et frais pour une production de feuilles maximale — mais la plante est d'une sobriété exemplaire et s'accommode de tout type de sol. On la fauche à ras trois à quatre fois par an, dès qu'elle atteint une cinquantaine de centimètres, du printemps à l'automne ; elle repart à chaque fois. Il est préférable de ne pas l'installer au pied d'un jeune arbre la première année ; à partir de la troisième année, la cohabitation ne pose plus de problème.

TARIFS

Pot de 1L

5 €

Disponibilités au 24/09/2026

Floraison	Printemps à été, violette, mellifère
Récolte	3 à 4 coupes, du printemps à l'automne
Exposition	Soleil à mi-ombre
Rusticité	-25°C
Feuillage	Caduc
Strate	Herbacée vivace (50 à 100 cm)
Multiplication	Division ou bouture de racine — variété stérile
Caractéristiques	Stérile, très riche en potasse

Osier jaune

Salix alba var. vitellina

Rameaux jaune vif à orangé tout l'hiver, souples et longs. Le saule des vanniers, des plessis et des berges. Un arbre à croissance rapide, beau et utile : un incontournable à accueillir dans son jardin sans modération.

— La plante

L'osier jaune n'est pas une espèce sauvage mais un cultivar du saule blanc, sélectionné pour la couleur et la souplesse de ses rameaux ; il ne se reproduit fidèlement que par bouturage. Son caractère distinctif tient à ses jeunes pousses, d'un jaune vif virant à l'orangé pendant l'hiver, quand l'arbre est nu — c'est à cette saison qu'il donne le meilleur de lui-même au jardin, au moment où presque tout le reste est éteint. La croissance est rapide. Laissé libre, il forme un arbre au port évasé puis retombant, pouvant atteindre une dizaine de mètres, au tronc subéreux jaune brun à gris profondément cannelé. Les chatons s'ouvrent en avril-mai : c'est une ressource de pollen précieuse pour les abeilles en sortie d'hiver.

— Usages

La vannerie d'abord, usage historique qui a fait la réputation de la plante. Conduit en têtard et recépé chaque année ou tous les deux ans, l'osier jaune fournit des brins longs, droits et souples : liens, paniers, corbeilles, nasses à poisson, cages — tout un pan de la vie paysanne d'autrefois reposait dessus, et les Ardennes en furent le premier département producteur. Fendus en lattes, les brins plus forts servaient aux claies, aux bâtis de tamis et aux boîtes à fromage.

Au jardin et sur le terrain, les usages sont tout aussi concrets : plessis et haies tressées, structures vivantes — clôtures, tunnels, pergolas plantées qui s'enracinent et reverdissent —, fascines et génie végétal pour stabiliser une berge ou lutter contre l'érosion, le système racinaire dense étant particulièrement efficace en zone humide. Egalement brise-vent à croissance rapide, arbre d'ombrage, et bois de chauffe.

— Culture

Sols détrempés à modérément secs : c'est un arbre de bord d'eau, à installer de préférence près d'un point humide, où il se développera au mieux. Exposition ensoleillée. Rusticité jusqu'à -29 °C. Pour obtenir la couleur la plus vive, il faut de jeunes rameaux : recéper à court intervalle, en têtard ou en cépée. Se bouture très facilement.

TARIFS

ÉPUISÉ

Plant en racines nues **épuisé** **15 €**

Disponibilités au 24/09/2026

Floraison	Avril à mai, chatons mellifères
Récolte	Rameaux en hiver, sur bois de l'année
Exposition	Soleil
Rusticité	-29°C
Feuillage	Caduc
Strate	Arbre (jusqu'à 10 m, ou têtard)
Multiplication	Bouturage de rameaux en hiver
Caractéristiques	Rameaux jaune vif, usages multiples

Index des variétés

FRUITIERS GREFFÉS

Pommiers

Api étoilé	p. 8
Belle fille de Salins	p. 9
Chantecler	p. 10
Charden	p. 11
Cloche	p. 12
De l'Estre	p. 13
Double Rose	p. 14
Joli bois	p. 15
Jonagold	p. 16
Jubilé	p. 17
Melrose	p. 18
Nationale	p. 19
Patte de loup	p. 20
Reine des reinettes	p. 21
Reinette Clochard	p. 22
Reinette d'Amboulne	p. 23
Reinette Desplanches	p. 24
Reinette du Canada	p. 25

Poiriers

Abbé Fétel	p. 27
Alexandrine	p. 28
Doyenné Boussoch	p. 29
Elliot	p. 30
Général Leclerc	p. 31
Harrow Sweet	p. 32
Marguerite Marillat	p. 33
Martin Sec	p. 34
Président Héron	p. 35
Williams	p. 36

Pruniers

D'Ente	p. 38
Datil	p. 39
Reine-Claude de Bavay	p. 40
Reine-Claude Dorée	p. 41

Asiminiers

Benny's Favorite	p. 43
Jerry's Big Girl	p. 44
KSU-Atwood	p. 45
KSU-Chappell	p. 46
Lehman's Delight	p. 47
Maria's Joy	p. 48
Overleese	p. 49
Rappahannock	p. 50

Plaqueminiers

<i>Diospyros kaki</i>	
Fuyu	p. 52
Tipo	p. 55
<i>Diospyros virginiana</i> × <i>Diospyros kaki</i>	
Russian Beauty	p. 53
Sofia's Gift	p. 54

Pêchers

<i>Prunus persica</i>	
Charles Roux	p. 57
Rouge d'Occitanie	p. 59
Tournier	p. 60
<i>Prunus persica</i> var. <i>nucipersica</i>	
Felligni	p. 58

AUTRES FRUITIERS

Mûriers

<i>Morus alba</i>	
Aureifolia	p. 63
Emmanuelle	p. 64
Fuji Red	p. 65
Full Season	p. 66
Taylor	p. 69
<i>Morus macroura</i>	
Pakistanais	p. 68
<i>Morus multicaulis</i>	
Loud Georgeous	p. 67

Figuiers

Dalmatie	p. 71
Desert King	p. 72
Encanto Honey	p. 73
Mischurinska 10	p. 74
Pastilière	p. 75

Grenadiers

Agat	p. 77
Hyrdonar x kiemizy Ak Bah	p. 78
Kazake	p. 79
Parfianka	p. 80
Sumbar	p. 81

Goumis du Japon

Sweet Scarlet	p. 83
---------------	-------

Chalefs d'automne

Fortunella	p. 85
Red Milan	p. 86

PETITS FRUITS

Groseilliers à grappes

Bar-le-Duc blanche	p. 89
Blanka	p. 90
Rodava	p. 91
Stanza	p. 92
Umka	p. 93
Versaillaise Blanche	p. 94
Versaillaise rouge	p. 95
Wilder	p. 96

Groseilliers à maquereau

Captivator	p. 98
Freedonia	p. 99
Hinnonmaki blanc	p. 100
Pixwell	p. 101
Spine Free	p. 102

Cassissiers

Andega	p. 104
Arno	p. 105
Blackdown	p. 106
Géant de Boskoop	p. 107

Casseilliers

Anita	p. 109
Josta	p. 110

Vignes

<i>Vitis interspécifique</i>	
Angela	p. 112
Galanth	p. 113
Goldlife Muscat	p. 114
<i>Vitis labrusca</i> × <i>vinifera</i>	
Isabelle	p. 115
<i>Vitis vinifera</i>	
Perdin	p. 116

Ronce fruitière (sans épine)

Lochness	p. 118
----------	--------

Gojis

Amber Sweet	p. 120
New Big	p. 121
Princess Tao	p. 122

PLANTES COMPAGNES

Plantes compagnes

<i>Salix alba</i> var. <i>vitellina</i>	
Osier jaune	p. 127
<i>Symphytum</i> × <i>uplandicum</i>	
Consoude - Bocking 14	p. 126
<i>Toona sinensis</i>	
Arbre à salade - Flamingo (Toona sinensis)	p. 125



**Merci
de votre
confiance**



pomaria.fr · contact@pomaria.fr · 06 79 02 62 50
Challes · 01250 Hauteclourt-Romanèche

